

Краткій каталогъ собственныхъ изданій

Наслѣдницы Г. Т. БРИЛЛІАНТОВА

Ольги Михайловны БРИЛЛІАНТОВОЙ

Москва, Петровскія ворота, 2-й Знаменскій пер., свой домъ (адресъ почтамту извѣстенъ). Адресъ для телеграмъ: Москва, Мобриллiантовой.

Телефонъ № 47-03 и 79-74.

Просимъ требовать подробный Систематическій Каталогъ бесплатно

Новая, весьма интересная, научно-популярная книга о женщинахъ всего мира вообще о русской въ особенности. Полная необходимая настольная книга для всѣхъ русскихъ женщинъ.

Женщина до брака, во время брака и женщина вдова.

ЖЕНЩИНА ВСѢХЪ ПЛЕМЕНЬ И НАРОДОВЪ.

ЕЯ ДУХОВНАЯ, ФИЗИЧЕСКАЯ И ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ.

Женщины Европы вообще и русскія женщины въ частности—съ анатомической, физиологической и психологической точки зрѣнія. Описание жизни женщины съ момента зачатія ея. Исслѣдованіе природы женщины во всѣхъ отношеніяхъ. Составилъ по новѣйшимъ русскимъ и иностраннымъ источникамъ С. Н. Аленсѣевъ, подъ редакціей д-ра медицины П. Попова и кандидата естественныхъ наукъ В. Гебеля. Книга иллюстрирована около 100 величѣйными рисунками, изображающими женщину всѣхъ народовъ въ самыхъ яркихъ краскахъ и моментахъ ея интимной жизни. Въ трехъ частяхъ.

Часть 1-я. Организмъ женщины. Женщина съ точки зрѣнія антропологической, психологической, эстетической, а также народнаго и религіознаго вѣрованія. Внутренніе и наружные половые и дѣтородные органы женщины всѣхъ племенъ и народовъ. Женская грудь.

Часть 2-я Женщина въ утробѣ матери. Дѣтство женщины, начало и развитіе ея половой зрѣлости. Любовь, сватовство и бракъ. Вступленіе женщины въ половую жизнь, оплодотвореніе, беременность и безплодіе. Гигіена беременности. Уходъ за роженицей, опасности и защита беременныхъ. Несвоевременные, случайные и преждевременные роды; выкидыши преднамеренный или вытравленіе утробнаго плода, естественный выкидышъ. Неправильные роды. Отчего рождаются двойни и тройни. Какъ предотвратить это. Медицинскія и народныя средства при родахъ. Гигіена послѣродоваго періода. Рожденіе дѣтей того или другого пола по желанію.—Проституція. Злоупотребленіе половыми извѣществами.

Часть 3-я Женщина-вдова. Прекращеніе половой дѣятельности, климактерическій возрастъ. Женщина въ предлѣдномъ и старческомъ возрастѣ. Воспитательница и руководительница подрастающаго поколѣнія. Дряхлость и старческое изнеможеніе.

Цѣна 3 р., въ хорош. колѣн. съ золот. тисн. переп. 3 руб.

W $\frac{236}{341}$ H10 $\frac{801-17}{175}$ 176 13253

ЛѢЧЕБНИКЪ - ТРАВНИКЪ.

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

КЪ ИЗЛѢЧЕНІЮ ВСѢХЪ БОЛѢЗНЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ТРАВАМИ.

Описаніе запаха, вкуса, мѣсторожденія, собиранія, способа храненія и дѣйствія на болѣзни цѣлебныхъ травъ.

РУКОВОДСТВО КЪ СОСТАВЛЕНІЮ ДОМАШНИМИ СПОСОБАМИ

лѣкарствъ изъ травъ и лѣченіе ими

съ приложеніемъ алфавитнаго указателя всѣхъ травъ и болѣзней, противъ которыхъ онѣ употребляются.

Составилъ Н. Григорьевъ.

Изданіе 4-е.

Государственная
Библиотека
СССР
им. В. И. Ленина

99078-55



2015188113

Москва, 1911 г. Типография П. В. ВЪЛЬЦОВА. Чистопрудный проезд, д. № 14.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Предъ нашими глазами изъ медицинской практики часто совершаются удивительныя, повидимому, вещи: болѣзнь, признанная нашими врачами, получившими высшее специальное образованіе, неисцѣлимою, проходитъ благодаря стараніямъ невѣжи—деревенскаго знахаря. А между тѣмъ при лѣченіи онъ пользовалъ своего, осужденнаго на смерть пациента не какими нибудь заморскими лѣкарствами съ мудреными латинскими названіями, а просто на просто одними невинными травами. И все таки, при всей подчасъ очевидности такихъ фактовъ, мы деревенскихъ лѣкарей почти всѣхъ поголовно окрещиваемъ названіемъ опасныхъ шарлатановъ, ихъ же врачебныя средства игнорируемъ.

Часто къ такимъ заключеніямъ о народныхъ лѣкаряхъ и лѣкарственныхъ средствахъ приводятъ насъ встрѣчающіеся случаи неудачнаго лѣ-

ченія, почти всегда сопровождаемые и нашептываніемъ и призываніемъ какихъ то невидимыхъ силъ и другими таинственными дѣйствіями, заставляющими и о знахаряхъ, и объ ихъ лѣченіи составлять неблагоприятныя заключенія. Однако были и есть (и тѣмъ болѣе будутъ) люди, которые на народную медицину смотрѣли и смотрятъ гораздо серьезнѣе и которые, не обращая вниманія на прикладную, такъ сказать, часть ея, ставили и ставятъ ее предметомъ своего наблюденія и изученія. Въ результатъ такого изученія и наблюденія часто открывается, что народная медицина обладаетъ такими средствами, которыми бы не мѣшало завестись и ученой медицинѣ. И дѣйствительно средства этой послѣдней постепенно увеличиваются или замѣняются народными средствами.

Несомнѣнно, что въ будущемъ народная медицина займетъ видное мѣсто въ дѣлѣ излѣченія человѣка отъ тѣлесныхъ и даже нѣкоторыхъ душевныхъ его немощей. Но даже и въ томъ видѣ, въ какомъ она теперь представляется намъ въ изслѣдованіяхъ, бывшихъ до сихъ поръ ученыхъ медиковъ, очищенная отъ предразсудковъ и суевѣрій простолюдиновъ, она и теперь можетъ сослужить хорошую службу народному здоровью.

Изъ сознанія же важности народной медицины для народнаго здоровья вытекаетъ, какъ прямое слѣдствіе, — необходимость распространенія ея въ народѣ, особенно въ такихъ уголкахъ, которые лишены всякой медицинской помощи. Достичь

же этого — всего успешнѣе можно посредствомъ изданія книжки, которая бы заключала въ себѣ основанія такой очищенной отъ суевѣрій и предразсудковъ и провѣренной на опытѣ народной медицины. Но этимъ вопросъ не вполне рѣшается. Недостаточно только издать книгу: какого бы довѣрія она по своему внутреннему достоинству ни заслуживала, необходимо, чтобы она могла съ успѣхомъ распространяться въ народѣ, а для этого, въ свою очередь, необходимо, чтобы свосю цѣной она была по средствамъ бѣдняку. Сказано „бѣдняку“, такъ какъ примѣненіе народной медицины всего важнѣе пока для недостаточныхъ, — принося имъ ту же пользу, она обойдется для нихъ несравненно дешевле аптечныхъ средствъ, которыхъ, подчасъ, и достать негдѣ, между тѣмъ какъ народныя средства всегда подъ рукой.

Однако и этого мало, — изданная книга можетъ заслуживать похвалы по внутреннему своему содержанию и доступна по своей стоимости для недостаточныхъ, но она можетъ быть изложена языкомъ, мало понятнымъ для нихъ. До сихъ поръ было издано только почти два изслѣдованія по народной медицинѣ: одно, къ сожалѣнію, не оконченное, извѣстнаго нашего доктора Кашинскаго и другое „Цѣлебныя силы природы“ неизвѣстнаго автора, изданія 1871 года. Но при всемъ ихъ внутреннемъ достоинствѣ, они не могутъ похвалиться ни общедоступностью по цѣнѣ, ни лег-

костью пониманія. Въ настоящемъ изданіи мы пытались соединить и то, и другое, и третье достоинство.

Такъ какъ народная медицина почти исключительно основана на лѣченіи отечественными травами, то и наше изданіе заключаетъ въ себѣ лишь описаніе употребительнѣйшихъ лѣкарственныхъ растеній.

Н. Григорьевъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ВСТУПЛЕНІЕ.

О сборѣ, приготовленіи, сохраненіи и употребленіи лѣкарственныхъ растеній.

Растенія дикорастущія бываютъ всегда дѣйствительнѣе воспитываемыхъ искусственно. При культурѣ ихъ, цѣлебная ихъ сила ослабѣваетъ. Нужно также принять во вниманіе, что успѣхъ въ излѣченіи иногда самыхъ застарѣлыхъ болѣзней одними извѣстными невинными травами зависитъ единственно отъ собиранія ихъ ежегодно на природныхъ своихъ мѣстахъ, также отъ надлежащаго приготовленія и сбереженія ихъ отъ вліянія воздуха и температуры, которые по большей части измѣняютъ или вовсе уничтожаютъ цѣлебную силу дѣйствительныхъ растеній. Почему и неудивительно, если выписываемыя изъ аптекъ лѣкарственные травы, бываютъ часто малодѣйствительны, — такъ какъ нерѣдко случается, что наши природныя растенія, лежа очень долгое время въ аптекѣ, или выдыхаются, или

же подвергаюся броженію, плѣсени, однимъ словомъ портятся.

А потому для надлежащаго испытанія врачебныхъ силъ нашихъ отечественныхъ растений и приготовленія изъ нихъ дѣствительнѣйшихъ лѣкарствъ, нужно стараться:

1. Собирають лѣкарственныя растенія въ ихъ естественномъ климатѣ и на той самой почвѣ, на которой ихъ предоставляетъ намъ природа.

2. Выбирать такое время, когда лѣкарственныя растенія всего болѣе обладаютъ своими цѣлительными силами.

3. Слѣдовать правиламъ, которыя излагаются ниже.

Корни растеній.

Корни однолѣтнихъ растеній должно выкапывать глубокою осенью того же лѣта, когда опадуть листья и стволы увянутъ, и весною, прежде чѣмъ листья и цвѣты начнутъ развиваться. Двухлѣтніе и многолѣтніе корни должно собирать весною, въ случаѣ же необходимости можно и осенью. При собираніи корней, должно выбирать самыя здоровыя изъ нихъ и сочныя. Обмывать корни не слѣдуетъ, очищать ихъ отъ пыли и вообще отъ постороннихъ веществъ всего лучше тогда, когда мы высушимъ корни. Сушить же ихъ нужно такъ: толстыя и сочныя корни,

разрѣзавъ въ длину пластинками или въ кружки и нанизавъ на нитку, развѣшивать въ тепломъ тѣнистомъ мѣстѣ, продуваемомъ вѣтромъ; можно сушить ихъ и въ печкѣ, но только самую умеренною теплотою, чаще развѣшивая и переворачивая ихъ. Высушивъ корни, ихъ нужно сохранять въ деревянныхъ ящикахъ, въ сухомъ и холодномъ воздухѣ, чтобы они не могли быть попорчены отъ плѣсени, сырости и червей. Благоговонныя корни слѣдуетъ сохранять въ стеклянныхъ, хорошо закупоренныхъ сосудахъ, чтобы изъ нихъ не улетучился ароматъ, а вмѣстѣ съ нимъ и ихъ цѣлебная сила. Корни, которые имѣютъ большую силу въ свѣжемъ состояніи, нежели въ сухомъ видѣ, слѣдуетъ сохранять въ погребѣ, въ сухомъ пескѣ. Древесныя корни, разрѣзанные пластинками, высушиваются солнечною теплотою.

Травы и листья.

Травы и листья душистыхъ растеній должно собирать передъ развертываніемъ цвѣтныхъ почекъ. Однолѣтнія растенія собираются, когда листья распустятся и начинаетъ развиваться цвѣтъ; точно также и многолѣтнія. Ясный день и полуденное при этомъ время для собиранія травъ и цвѣтовъ должно избирать предпочтительно

всякому другому времени, такъ какъ примѣчно, что растенія, собираемыя въ сухое время, бываютъ дѣйствительнѣе.

Травы связываютъ въ пучки и вѣшаютъ въ тѣнистомъ [и продуваемомъ вѣтромъ мѣстѣ]. Если же требуется сушить одни листы, то, отдѣливъ ихъ отъ стебельковъ, растилаютъ ихъ на подстилкѣ или на доскахъ тонкими слоями, въ тѣнистомъ же мѣстѣ. При высушиваніи сочныхъ, большихъ листьевъ можно употреблять умеренную печную теплоту. Листья омега и другихъ растеній, обладающихъ тонкимъ, летучимъ веществомъ слѣдуетъ, по высушиваніи, истереть въ порошокъ и сохранять его въ плотно закупоренныхъ стеклянныхъ сосудахъ.

При храненіи травъ и листьевъ, отнюдь не должно смѣшивать ихъ между собою; каждое заготовленное растеніе должно сохраняться отдѣльно отъ другихъ, а не въ одномъ мѣстѣ, напр., въ ящикѣ или въ мѣшкѣ. Къ этому нужно еще прибавить, что необходимо ежегодно возобновлять запасъ свѣжихъ травъ, хотя бы ихъ оставалось отъ прежняго еще года, такъ какъ годовалыя травы, сѣмена, корни, плоды и корки слабѣе свѣжихъ.

Ц в ѣ т ы .

Ихъ собирать нужно тогда, когда они только что распустятся; если же цвѣты цвѣли уже нѣсколько дней, то отъ этого они теряютъ свою силу; отцвѣтшіе же совсѣмъ не годятся. Собирать ихъ слѣдуетъ въ ясный день и при томъ около полудня, когда обсохнетъ роса. Сохранять въ ящикахъ; сильно пахучіе цвѣты—въ стеклянкахъ, завязанныхъ пузыремъ и бумагой. Мѣсто для сохраненія должно выбирать сухое и холодное.

Сѣмена и плоды.

Сѣмена собираютъ лишь тогда, когда они совершенно созрѣли, при чемъ снимать ихъ съ растенія всего лучше вмѣстѣ съ сѣменными коробочками, такъ какъ въ нихъ сѣмена сохраняются и лучше, и проще. Сѣмена сочныя, масляныя въ особенности, должны обращать на себя вниманіе при ихъ сбереженіи, такъ какъ они легко портятся. Выбирать сѣмена, при ихъ заготовленіи, должно полныя и свѣжія. Всего лучше производить это, опуская ихъ въ воду; потонувшія—лучшія сѣмена.

Плоды и ягоды собираютъ также совсѣмъ зрѣлыми. Необходимо сберегать ихъ отъ гнилости,

плѣсени и насѣкомыхъ; поврежденные не годят- ся. Для заготовленія въ прокъ, зрѣлые плоды толкутъ, выжимаютъ сокъ и увариваютъ его до густоты патоки. Хранить въ каменныхъ или стек- лянныхъ банкахъ.

Корки дерева и шишки.

Лѣкарственные корки дерева и вѣтви ку- старниковъ слѣдуетъ срѣзывать весною, очищая ихъ при заготовленіи отъ постороннихъ ве- ществъ. Шишки и почки также весною, стебли— подь осень. Корки съ кустарниковъ обрѣзывать осенью. При сборѣ выбираютъ молодая, здоро- вья деревья. Сушатъ взятыя отъ нихъ части въ умѣренной теплотѣ. Тѣже растенія, которыя отъ долгаго храненія и сушенія теряютъ свою цѣли- тельную силу, слѣдуетъ употреблять всегда свѣ- жими, собирая ихъ въ какое придется время года.

Если при сборѣ и храненіи цѣлебныхъ расте- ній, будутъ слѣдовать правиламъ, только что изложеннымъ, то, можно надѣяться, что наши отечественныя травы будутъ въ состояніи сопер- ничать по своей силѣ и пользѣ съ привозными иностранными медикаментами.

Сравнительный медицинскій вѣсъ и мѣра.

При разсмотрѣніи качествъ извѣстной травы, ея силы и употребленія, количество ея приемовъ во внутрь и снаружи будетъ выражаться ме- диканскимъ вѣсомъ и мѣрою. Для незнакомыхъ съ ними здѣсь помѣщается таблица, въ которой части аптечнаго фунта сравнены съ частями рус- скаго.

АПТЕЧНЫЙ ВѢСЪ.					РУССКІЙ ВѢСЪ.			
Фунт.	Унц.	Драх.	Скру- пулы.	Гран.	Фунт.	Лоты.	Золот.	Осьм золот.
1=	12	96	288	5760	$\frac{3}{4}$	24	72	576
$\frac{1}{2}$ =	6	48	144	2880	$\frac{3}{8}$	12	36	288
$\frac{1}{4}$ =	3	24	72	1440	$\frac{3}{16}$	6	18	144
	1=	8	24	480	—	2	6	48
		1=	3	60	—	—	$\frac{3}{4}$	6
			1=	20	—	—	$\frac{1}{4}$	2
			$\frac{1}{2}$ =	10	—	—	—	1

Переводя аптечный вѣсъ на мѣру, мы видимъ, что *гранъ* равняется тяжести ячменнаго или пшеничнаго зерна или одной капль спиртной настойки; *горсть* содержитъ въ себѣ $\frac{1}{2}$ унціи или 1 лотъ или 3 золотника; *щепоть* = 1 драхмъ или $\frac{3}{4}$ золотника; *столовая ложка* для принятія жидкостей равна $\frac{1}{2}$ унціи, или 1 лоту, или 3 золотникамъ; драхма или $\frac{3}{4}$ золотника равны вѣсу заключаемаго въ *десертной ложкѣ*; *чайная ложка* вмѣщаетъ травянаго порошка $\frac{1}{2}$ драхмы или $\frac{3}{8}$ золотника; спиртныхъ жидкостей отъ 1 скрупула до $\frac{1}{2}$ драхмы; сиропа, кашки и другихъ смѣшеній — отъ 1 до 2 драхмъ или $\frac{3}{4}$ до $1\frac{1}{2}$ золотника. *Чайная чашка* заключаетъ въ себѣ 3 - 4 унц. водяной наливки, отвара, микстуры и проч. *Рюмка* содержитъ отъ $1\frac{1}{2}$ до $2\frac{1}{2}$ унцій или = 3 - 5 лотамъ.

Примѣчаніе. Каждое лѣкарство слѣдуетъ давать сначала въ малыхъ приемахъ и потомъ постепенно ихъ увеличивать. Величина же приемовъ зависитъ вообще и главнѣе всего отъ возраста принимающаго лѣкарства; лицо болѣе сильное и развитое физически, должно пользоваться приемами большаго размѣра.

Описание цѣлебныхъ отечественныхъ растений, расположенныхъ въ алфавитномъ порядкѣ.

А.

Авранъ или лихорадочная трава, благодать. Свѣжая толченая трава аврана прикладывается для разведенія ломотныхъ опухолей и къ ушибамъ, если они соединены съ подкожнымъ кровоизліяніемъ. Сухая же можетъ съ успѣхомъ замѣнить александрійскій листь, ялапный корень, сабуръ и пр. слабительныя средства. Сухой корень, въ приемѣ до 2 скрупуловъ, дѣйствуетъ на подобіе ипекакуаны. Сухая трава въ видѣ порошка, въ приемахъ отъ 2 до 20 гр. хорошо дѣйствуетъ при лѣченіи брюшной водяной болѣзни и при ножныхъ водяныхъ отекахъ. Экстрактъ аврана, приготовленный чрезъ отвариваніе въ водѣ и выпареніе, есть весьма хорошее средство въ венерическихъ опухоляхъ костей, застарѣлыхъ и раковыхъ язвахъ, темной водѣ и упорной чесоткѣ. Даютъ его приемами отъ 2 до 4 гр. поутру и ве-

черомъ въ пилюляхъ; въ сумасшествіи отъ 20 — 30 до $\frac{1}{2}$ драхмы. Наконецъ авраномъ успѣшно лѣчатъ лихорадки.

Анисъ, ганусъ. Его въ особенности можно рекомендовать при разстройствѣ пищеваренія, грудныхъ, мокротныхъ припадкахъ и вѣтряной коликѣ. Дается въ видѣ порошка отъ 10—20 гр. Анисъ въ такомъ видѣ можно давать даже дѣтямъ. Анисовымъ масломъ натираютъ больной животъ, твердыя холодныя опухоли и части, пораженныя ревматизмомъ.

Аиръ или ирѣ, сабельникъ, касатикъ. Его корень съ большою пользою употребляютъ въ слѣдующихъ случаяхъ: дѣтской сухоткѣ, золотухѣ, англійской болѣзни; въ цинготной разслабленности, въ случаяхъ разстройства пищеваренія, застарѣлой ломотѣ суставовъ, гнилости десенъ; въ зажной водянкѣ, запорѣ мочи, блѣдной немочи и бѣляхъ; кромѣ того корнемъ аира излѣчиваютъ перемежающія лихорадки и гнилыя горячки. Корень аира есть также одно изъ вѣрнѣйшихъ средствъ противъ глистовъ у дѣтей, а присыпка изъ него считается лучшею для присыпанія костоѣдныхъ язвъ. Наконецъ ежедневное растираніе золотушныхъ и рахитическихъ дѣтей отварами корня, смѣшаннаго съ равною частью виннаго спирта, имѣетъ на нихъ самое благотѣльное вліяніе. Внутри ирный корень употребляютъ въ порошокъ отъ 20 гр. до $\frac{1}{2}$ драхмы, или въ видѣ каши. для приготовления которой берутъ

1 или 2 драхмы порошка, смѣшиваютъ его съ медомъ и въ этой формѣ даютъ корень дѣтямъ по чайной ложкѣ, нѣсколько разъ въ день. Въ лихорадкахъ и горячкахъ ирный корень даютъ въ видѣ наливки, для приготовления которой $1\frac{1}{2}$ унца толченаго корня завариваютъ 16-ю унц. горячей воды; прокипятивъ ее въ закрытомъ сосудѣ и, по охлажденіи, процѣдивъ, прибавляютъ на каждыя 12 унцій отвара, 4 драхмы гофманскихъ капель. Принимать по 2 столовыхъ ложки чрезъ каждыя 2 часа.

Арбузъ. Сѣменное молоко даютъ въ воспалительныхъ лихорадкахъ, сопровождающихъ значительныя раны, а также въ мочерѣзѣ, вмѣсто питья.

Артишокъ. Его употребленіе особенно полезно для одержимыхъ частыми запорами мочи, мочерѣзомъ и водяною болѣзнію.

В.

Баунъ, баульникъ, клоповникъ. Изъ 3 или 4 драхмъ травы и 12 унцій воды составляется наливка, которую очень полезно употреблять при кровавомъ поносѣ, судорожномъ кашлѣ, ломотныхъ боляхъ и злой чесоткѣ. Пьютъ по чайной чашкѣ нѣсколько разъ въ день.

Баранья трава. Въ ушибахъ, съ подкожнымъ кровоизліяніемъ, застарѣлыхъ гнилыхъ язвахъ;
Лѣчебникъ-Травникъ.

помертвѣлости—цвѣты и корень бараньей травы заслуживаетъ полнаго вниманія. Съ этою цѣлю ихъ употребляютъ въ видѣ примочки.

Барвинокъ, уробная трава, малая мошльница. Одобряютъ какъ хорошее средство въ слабости легкихъ, кровохарканіи, маточнымъ и почечуиномъ кровотеченіяхъ, женскихъ бѣляхъ и чахоткѣ. Употребляютъ внутрь въ видѣ отвара, приготовляемаго изъ унціи травы и фунта воды. Свѣжая толченая трава унимаетъ кровь и заживляетъ раны.

Батеръ, медуничникъ, бѣлоголовецъ, шламда, лабазникъ, раповникъ, дикая рябина. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи даютъ порошокъ сушеныхъ цвѣтовъ, посыпавъ имъ хлѣбъ, укушеннымъ бѣшеной собакой.

Береза. Наливка изъ листьевъ употребляется въ простудѣ, цинготной ломотѣ, въ чесоткѣ и вообще сыпяхъ, происходящихъ отъ нечистоты крови. Въ послѣднемъ случаѣ снаружи употребляется крѣпкій отваръ листьевъ. Березовый сокъ дѣйствуетъ, какъ противоцинготное и мочегонное средство, употребляется и при мелкихъ глистахъ. Березовый деготь рекомендуется въ мочевыхъ припадкахъ, слѣпотѣ, раковыхъ, червячыхъ и другихъ злокачественныхъ язвахъ. Смѣшавъ его съ такимъ же количествомъ березовика, употребляютъ по нѣсколько разъ въ день для очищенія сыпей и отъ золотухи.

Божье дерево. Употребляется противъ слабости желудка, худосочія, прекращенія у женщинъ регуловъ и противъ бѣлей—въ видѣ отвара или наливки,—для приготовленія которыхъ на унцію травы берется 4 унц. горячей воды, или вина.

Болшоловъ, омегъ, головоломъ, мутникъ, вонючка, дятярка. Растеніе очень ядовитое, поэтому оно употребляется чаще всего какъ наружное средство и рѣже внутрь, именно, какъ успокоительное противъ нервныхъ страданій при столбнякѣ, пляскѣ св. Витта, судорогахъ мышцъ, при сильномъ кашлѣ, одышки и особенно при коклюшѣ.

Принимаемый внутрь въ большихъ приемахъ, омегъ производитъ поносъ и можетъ изгонять круглыхъ и даже плоскихъ глистовъ. Отъ омега исчезаютъ опухоли, затверденія, гипертрафіи и даже скирръ; бывали даже случаи, что въ болѣзняхъ принятыхъ за ракъ, омегъ производилъ коренное исцѣленіе или способствовалъ къ этому. Для этого приготовляютъ мазь, смѣшивая порошокъ травы съ медомъ, или просто прикладываютъ къ язвамъ свѣжіе листы, смазанные медомъ. Внутри принимаютъ порошокъ изъ высушенныхъ листьевъ отъ 3 до 6 гранъ, по нѣсколько разъ въ день,—или сокъ изъ свѣжихъ листьевъ, собранныхъ во время цвѣтенія причемъ, давъ ему отстояться, процѣживаютъ и даютъ больнымъ нѣсколько разъ въ день по столовой ложкѣ.

Точно также полезна настойка омега въ винномъ спиртѣ; принимаютъ по 10—20 капель. Есдають нѣкоторые врачи въ воспаленіи дыхательныхъ вѣтвей и противъ туберкулезной чахотки.

Брусника. Ягоды ея дѣйствуютъ какъ противовоспалительное средство. Паренныя ягоды въ собственномъ соку и смѣшанныя съ толокномъ и медомъ очень полезно употреблять въ чахоткѣ. Листья, употребляемые въ видѣ отвара, полезны въ каменной болѣзни, простомъ и кровавомъ поносѣ.

Для этого отвара 2 драхмы листьевъ въ порошокъ кладутъ на 8 унц. воды и кипятятъ, пока останется $\frac{1}{2}$ фунта жидкости. Принимаютъ его 3 раза въ день по 2 унціи.

Бузина черная, деревянная, боръ дерево. Дѣйствіе свѣжей корки проносное и отчасти рвотное; сухіе цвѣты дѣйствуютъ какъ потогонное и разбивающее средство, а ягоды—какъ охлаждающіе. Средняя или луговая корка полезна въ водяной болѣзни, листья—въ трудномъ родовомъ кровоочищеніи. Употребленіе цвѣтовъ полезно въ простудномъ кашлѣ, ревматизмѣ, членовой ломотѣ, грудныхъ мокротныхъ припадкахъ, въ нагноенныхъ сыпяхъ и рождѣ. Бузинныя цвѣты служатъ также для предовращенія простуды въ кори и другихъ нагноенныхъ сыпяхъ, содѣйствуя скорѣйшему выдѣленію ихъ наружу. Отваръ корки составляется изъ унціи корки и фунта воды; ее хорошо вывариваютъ и пьютъ вмѣсто

чаю. Настойка изъ цвѣтовъ готовится изъ 2 или 3 цвѣтовъ и 12 унц. воды. Отъ водяной болѣзни употребляютъ сокъ изъ свѣжей зеленой корки и листьевъ, смѣшивая его съ простымъ виномъ и принимая утромъ и вечеромъ по столовой ложкѣ.

Буковица черная, кашникъ. Травы и цвѣты рекомендуются въ слабости нервовъ, головныхъ, припадкахъ, судорожныхъ болѣзняхъ, маточныхъ припадкахъ; простудной ломотѣ, поврежденіи легкихъ и почекъ, хвалятъ ее противъ обмороковъ, онѣмѣлости членовъ, желтухи, мокротной чахотки; порошокъ изъ сухенныхъ листьевъ нюхаютъ при долговременномъ насморкѣ. Наливка изъ буковицы готовится изъ горсти сухой травы и 12 унц. горячей воды. Дѣвушкамъ, страдающимъ блѣдною немочью, совѣтуется пить буковицу въ винной настойкѣ.

Бѣлена черная, блекота. Очень ядовита; большіе приемы ея могутъ имѣть своимъ послѣдствіемъ смерть. Снаружи и внутри она употребляется какъ успокоительное, противосудорожное и болеутоляющее средство: въ гастральгій, личной и зубной боли; въ болѣзняхъ дыхательныхъ органовъ, противъ коклюша, грудной жабы. Бѣлена, кромѣ того оказываетъ разрѣшающее дѣйствіе въ золотушныхъ страданіяхъ железъ и другихъ органовъ. Снаружи она употребляется въ видѣ припарокъ, (при нарывахъ, железистыхъ опухоляхъ, язвахъ и пр.) съ омегомъ, мукою

льнянаго сѣмени и проч. также въ видѣ вскипа для примочекъ промывательныхъ (напр. при страданіяхъ прямой кишки). Изъ бѣлены приготовляютъ экстрактъ настаиваніемъ выжатаго сока виннымъ спиртомъ и выпареніемъ въ умѣренной температурѣ. Употребляется внутрь 1—2 гр. нѣсколько разъ въ день, увеличивая осторожно приемы. Даютъ этотъ экстрактъ въ пилюляхъ, рѣже въ порошокѣ. Настойка изъ бѣлены приготовляется вымачиваніемъ травы въ винномъ спиртѣ и водѣ. Даютъ внутрь по 10—30 капель.

Бѣлена бѣлая имѣетъ свойства черной.

Бѣлокопытникъ, мать и мачиха, матерникъ, подбѣлъ, двоиственникъ. Сокъ, выжимаемый весною изъ кореньевъ и листьевъ, полезенъ въ золотушныхъ болѣзняхъ. Свѣжая и сухая трава очень полезна въ кашлѣ, одышкѣ, золотушной чахоткѣ и сухоткѣ. Наливка составляется изъ горсти травы и 12 унц. горячей воды.

В.

Василекъ, лоскутница ржаная. Настойка изъ цвѣтовъ, какъ примочка, укрѣпляетъ слабое зрѣніе.

Василистникъ, золотуха желтая, заплиса, лювовая рута, золотень, живительная трава, матренка. Корень полезенъ отъ заваловъ, запоровъ и желтухи. Листья рекомендуютъ въ кровохарка-

ни, теченіи бѣлей. Хорошимъ также въ этихъ случаяхъ средствомъ служить сокъ цвѣтной травы въ приемѣ отъ 1—2 унцій. Отваръ составляется изъ 1 ф. воды и унція травы.

Верба бѣлая, или ветла, пятимужная, или черный тальникъ, ломкая, или ива хрупкая. Вербная корка въ перемежающихся лихорадкахъ часто съ успѣхомъ замѣняетъ хину. Кромѣ того ее полезно употреблять въ слабости желудка и чахоткѣ, въ цингѣ и застарѣлыхъ язвахъ, порчѣ зубовъ отъ гнилости. Употребленіе изъ вербной корки такое: ее даютъ въ порошокѣ, приготовленномъ изъ коры молодыхъ вѣтвей бѣлой вербы отъ 20 гранъ до 1 драхма, или въ видѣ отвара, который составляется изъ двухъ унцій корки и 2 фунтовъ воды; смѣсь кипятятъ, пока останется 16 унцій жидкости. Ванны изъ ивовой коры помогаютъ дѣтямъ, страдающимъ слабостью ногъ и сиднямъ. Крѣпкимъ отваромъ корки полезно промывать раны, язвы и сыпи.

Вероника аптечная употребляется вмѣсто чаю въ простудномъ кашлѣ, мокротной одышкѣ, чахоткѣ, почечныхъ припадкахъ отъ камня, кровавомъ мочеиспращеніи, зудѣ и чесоткѣ. Для наливки 3 драхмы сухой травы кладется на 8 унцій горячей воды. Снаружи свѣжая толченая трава прикладывается къ худосочнымъ язвамъ. *Вероника ручейная* или *ибунка, козій ростъ, козья морда, цинготная трава, поточникъ*—главнымъ образомъ полезна для цинготныхъ. Для внутрен-

няго употребленія изъ нея дѣлается наливка 1 или 2 горсти свѣжей травы наливають 12 унц. сыворотки, которую прокипятивъ и процѣдивъ, даютъ больнымъ по двѣ унціи нѣсколько разъ въ день.

Виноградъ— употребляемый умеренно служить лучшими осенними ягодами, полезными въ кашлѣ, сухоткѣ, брюшныхъ завалахъ, желчныхъ горячкахъ, мочерѣзѣ и цингѣ. Виноградные листья одобряются для полосканья въ жабѣ. Излишнее употребленіе винограда производитъ изнурительный поносъ и часто даже рвоту.

Водоленъ сухой, копытень или подлѣсникъ, подорышникъ, облапа, обхватка, скапидарникъ. Корень водоленя въ особенности полезенъ въ водяной болѣзни, въ брюшныхъ завалахъ, запорѣ кровей, желчныхъ припадкахъ и въ меланхоліи. Порошокъ сухихъ листьевъ отъ 4 до 5 гранъ, какъ нюхательное, употребляемый на ночь производитъ на слѣдующее утро обильное истеченіе мокроты и такимъ образомъ проходитъ насморкъ и головная боль. Корень копытена можетъ замѣнять рвотный корень ипеакауаны. Отваръ же его въ водѣ—превосходное мочегонное средство: для этого берутъ 4 драхмы травы или 2 драхмы корня на фунтъ воды; его принимаютъ по 2 столовыхъ ложки каждыя два, или три часа.

Вологлотка, дубравка пирамидная, живучая трава, синяя горляника, одногубка. Полезно употреб-

лять въ простомъ и кровавомъ поносѣ, излишнихъ теченій мѣсячныхъ кровей, отъ женскихъ бѣлей, кровохарканія, заваловъ печени, въ наружныхъ ранахъ, ожогахъ, цинготныхъ поврежденіяхъ десенъ, молочницъ во рту и гортанной жабѣ. Внутри даютъ ее въ видѣ отвара: 1 унцію сухой травы кладутъ на фунтъ воды, хорошенько кипятить и процѣдивъ, и подсластивъ медомъ пьютъ холодный по чайной чашкѣ. Снаружи служитъ какъ полосканье и вспрыскиванье.

Волчье лыко, волчій перецъ, дикій перецъ, лаврикъ волчій, шелковое лыко, волчая ягода. Ягоды его очень ядовиты: 10—12 ихъ могутъ причинить смерть. Употребляется внутри противъ золотухи, особенно же противъ сифилитическихъ страданій костей и надкостной плевы, при хроническихъ ревматическихъ накожныхъ болѣзняхъ. Даютъ его въ видѣ отвара отъ 2—4 драхмъ въ день. Дѣйствіе волчьяго лыка, наружнаго средства, медленно и слабо.

Волчій корень, борецъ, проградъ, прострѣлъ, прикрышъ, волкобой. Растеніе очень ядовитое, отъ большихъ приемовъ слѣдуетъ смерть со всѣми признаками отравленія. Его главнымъ образомъ употребляютъ въ болѣзненныхъ состояніяхъ, которыя составляютъ болѣе или менѣе чистыя нервныя страданія: при нервной боли лица, суставовъ, поясницы, бедра, также при зудѣ и лишаяхъ. Кромѣ того противъ ревматическихъ болей, истеричес-

кихъ и удушливыхъ страданій. Изъ волкобоя приготавливаются *extraclum aconii* и *tinctura aconiti*. Первый получается водянымъ вытяженіемъ травы съ прибавленіемъ виннаго спирта. Употреблять нужно отъ 6—12 гр. лучше всего въ видѣ пилюль съ порошкомъ солодковаго корня, или же въ видѣ порошка. Снаружи этотъ экстрактъ употребляется въ видѣ мази, намазанной на пластырь, или въ растворенной въ водѣ, ароматныхъ наливкахъ, противъ невральгическихъ, ревматическихъ страданій. *Tinstura aconiti* получается настаиваніемъ травы съ виннымъ спиртомъ. Употребляется снаружи для втиранія. Средство это гораздо съ большею пользою можно употреблять въ хроническихъ ломотахъ, костныхъ, ночныхъ боляхъ и разнородныхъ застарѣлыхъ сыпяхъ, нежели въ тѣхъ болѣзненныхъ припадкахъ, которые еще не такъ застарѣлы. Но при этомъ должно принять во вниманіе, что слишкомъ долгое употребленіе ослабляетъ желудокъ и приводитъ чувства въ онѣмѣніе.

Волчецъ кудрявый, стоголовникъ, осотъ, чертополохъ. Свойства этого растенія противоглистныя, потогонныя и мочегонныя. Употребляется нерѣдко при разстроенномъ пищевареніи, при хроническомъ катаррѣ, ревматизмѣ и ломотѣ, перемежающихся лихорадкахъ, желтухѣ, зажной водянкѣ, простудномъ колотѣ, мокротномъ кашлѣ и удушѣ. Для наливки берутъ 2 драхмы сухой травы на 4 унціи воды.

Виноградная настойка листьевъ чертополоха, въ приемахъ по одной или по двѣ столовыхъ ложки по утру и вечеру, по свидѣтельству Кашинскаго, излѣчиваетъ застарѣлые ревматизмы.

Вороній глазъ, воронецъ, однолюдинокъ. Снаружи листья и ягоды этого растенія употребляются въ видѣ катоплазмы въ злокачественныхъ нарывахъ, опасныхъ воспаленіяхъ глазъ и ногтей. Корень имѣетъ легкую рвотную силу и своимъ дѣйствіемъ замѣняетъ ипекакуану. Дается корень въ порошокъ съ сахаромъ по 1 или 2 гр. каждые два часа — облегченія желудка при излишествѣ мокротъ и для очищенія желудка въ желчныхъ лихорадкахъ. Порошокъ, какъ рвотное, употребляется въ количествѣ 40 гр. до $\frac{1}{2}$ драхмы и 3 скрупуловъ. Запиваютъ теплою водою.

Вязъ, илемъ полевой. Отваръ корки вяза полезенъ въ чесоткѣ, лишаяхъ, паршахъ, проказѣ и застарѣлыхъ язвахъ; кромѣ того въ упорной ломотѣ, лихорадкахъ, поносахъ, водяной болѣзни и кожныхъ болѣзняхъ венерическаго свойства. Для внутренняго употребленія: 1 или 2 унціи молодой корки варятъ въ 2 фунтахъ жидкости, пока останется половина жидкости. Продолженный употребляютъ по чайной чашкѣ. Какъ наружное средство употребляется крѣпкій отваръ корки — для омыванія и примочки (4 унціи корки на 4 ф. воды, уваривать, пока останется половина жидкости). Американцы для заживленія ранъ и язвъ присыпаютъ ихъ толченою ко-

рою. Молодые листочки весной можно варить въ кушанье, какъ здоровую зелень.

Г.

Глазница аптечная, очная помощь, очная трава, свѣтликъ. Растетъ по краямъ дорогъ и лѣсовъ и на лугахъ. Запаху не имѣетъ, вкусъ горьковатый и вяжущій.

Народная медицина почитаетъ это растеніе однимъ изъ лучшихъ средствъ противъ глазныхъ болѣзней и именно противъ начальной слѣпоты и пятень, застилающихъ зрѣніе. Сокъ, выжатый изъ свѣжихъ листовъ, и смѣшанный съ бѣлымъ виномъ и медомъ, впускаютъ съ этою цѣлію ежедневно по одной каплѣ въ глаза.

Глухая крапива, яснотка бѣлая, пчелососка. Трава и цвѣты, въ видѣ наливки и отвара полезны: въ разныхъ маточныхъ болѣзняхъ, истерическихъ припадкахъ, судорогахъ въ животѣ; отъ застарѣлаго кашля и удушья и воспаленій въ груди. Выжатый сокъ изъ свѣжаго растенія рекомендуется въ маточномъ и носовомъ кровотеченіяхъ, теченіи бѣлей, золотухѣ и чахоткѣ. Цвѣтныя верхушки, настоянныя въ деревянномъ маслѣ на солнечной теплотѣ, составляютъ раноцѣлительный бальзамъ противъ застарѣлыхъ язвъ на ногахъ. Наливку крапивы пьютъ вмѣсто чаю, она составляется изъ одной или двухъ ще-

потей цвѣтныхъ верхушекъ и 6 унцій горячей воды. Отваръ же готовятъ такъ: $\frac{1}{2}$ унціи травы варятъ въ фунтѣ воды, до тѣхъ поръ, пока останется 10 унц. жидкости; принимать его слѣдуетъ по чайной чашкѣ 2 или 3 раза въ день. Выжатый сокъ можно принимать по двѣ унціи.

Горохъ. Гороховый отваръ сильно дѣйствуетъ на мочевые пути и гонитъ каменную дресву изъ почекъ и мочеваго пузыря. Гороховая мука, прикладываемая въ видѣ сухой припарки, весьма хорошо разводитъ твердыя опухоли груди и ядеръ.

Горчица-черная. Чаще всего она употребляется снаружи для такъ называемыхъ [горчичниковъ, вездѣ, гдѣ желаютъ сильно и скоро раздражить кожу, чтобы произвести „отвлекающее или возбуждающее дѣйствіе. Внутри порошокъ горчицы даютъ противъ водянки и особенно послѣ перемежающейся лихорадки, для чего его отвариваютъ въ закрытомъ сосудѣ съ 1 фунтомъ пива или сыворотки и употребляютъ по стакану въ теченіи 1—2 дней.

Гребенникъ, чаирскій чай, чистецъ, мунгалскій чай. Это растеніе можетъ быть употребляемо во всѣхъ случаяхъ, гдѣ одобряется хинная корка. Даже болѣе—опыты надъ сотнями людей показали, что тамъ, гдѣ хина не производила никакого дѣйствія надъ больными, гребенникъ исцѣлялъ ихъ. Это въ особенности должно принять во вниманіе людямъ, которые страдаютъ лихо-

радкую, происходящую отъ слабости. Кромѣ того гребенникъ можетъ быть употребляемъ также въ слабости желудка, трудномъ пищевареніи, поносѣ, запорѣ мѣсячныхъ кровей, блѣдной немочи, теченіи бѣлей, водяной болѣзни, чахоткѣ и въ дѣтскихъ болѣзняхъ: сухоткѣ, золотухѣ и англійской болѣзни. Корень дается въ порошокъ отъ $\frac{1}{2}$ —1—2 и 3 драхмъ съ медомъ, въ видѣ каши. Для отвара кладется 1 унція на фунтъ воды, которую должно кипятить въ закрытомъ сосудѣ, пока останется 6 унц. жидкости. Этотъ отваръ пьютъ по чайной чашкѣ.

Губка бѣлая, растетъ на пняхъ лиственницы. Рекомендуются въ изнурительномъ поту больнымъ чахоткою и для испраженія поглощенныхъ постороннихъ тѣлъ. Дается на ночь въ порошокъ по 2 гр. съ водою. Снаружи употребляется противъ кровотеченія въ видѣ присыпки. Собираютъ ее зимою. Давая внутрь, примѣшивать вишневаго клею.

Губка вербная или пахучая употребляется точно также въ чахоткѣ и въ ипохондріи. Принимать въ видѣ порошка по утру и въ вечеру отъ $\frac{1}{2}$ —2 драхмъ съ медомъ или сахаромъ.

Губка древесная, растущая на гниющихъ дубовыхъ, березовыхъ, вязовыхъ и липовыхъ пняхъ. Употребляется для остановленія крови при разсѣченіи артерій или небольшихъ венъ. Положивъ одна на другую нѣсколько мягкихъ пла-

стинокъ губки и покрывъ сложеннымъ полотенцемъ, укрѣпляютъ ихъ круговою повязкой.

Гулявникъ, жеруха струйчатая, мудрость лжкарская. Внутрь употребляется въ истерическихъ припадкахъ, поносахъ, кровохарканіи, маточномъ кровотеченіи, бѣляхъ, каменной и водяной болѣзни и глистовъ. Въ такихъ случаяхъ дается толченое сѣмя по драхмѣ чрезъ 2 часа съ водою; или въ видѣ горячей наливки съ медомъ, предъ приступомъ лихорадки.

Д.

Двузубецъ, череда, козьи рожки, собачки, коноплянка. Его съ особымъ успѣхомъ употребляютъ противъ золотухи, особенно если въ наливку прибавить по равной части цвѣтовъ анютиныхъ глазокъ, листьевъ черной смородины и калиновыхъ молодыхъ побѣговъ.

Девясилъ, уманъ.—Корень девясила рекомендуютъ въ блѣдной немочи, худосочіи, цинготной ломотѣ. Толченые листья прикладываются для разведенія твердыхъ опухолей, утоленій ломотныхъ болей, очищенія гнилыхъ язвъ и заживленія ранъ. Изъ корня девясила готовится мазь, которая скоро уничтожаетъ золотушные и чесоточныя сыпи; для составленія ея требуется: $\frac{1}{2}$ фунта свѣжаго и мелко изрѣзаннаго корня варить въ 3 фунтахъ воды, пока превратится въ

слизь, которую выжавъ, смѣшать съ 6 унц. свѣжаго, несоленаго коровьяго масла. Мазать пораженныя мѣста на ночь, утромъ промывать теплотою водою. Для наливки надо взять на 6 унц. горячей воды 2 драхмы толченаго корня.

Дрокъ, шильная трава. Употребляется съ большою пользою въ водяной и каменной болѣзни. Въ первомъ случаѣ даютъ настойку изъ бѣлаго вина и дрока (во всѣхъ его частяхъ), во второмъ наливку сѣмянъ по 2 или 3 раза въ день.

Дубровка, очанка, ростротъ. Дѣйствіе этой травы потогонное, возбуждающее, очищающее и укрѣпляющее. Употребляется въ худосочиі, блѣдной немочи, запорѣ кровей, застарѣломъ кашлѣ, мокротной одышкѣ, кровохарканіи, лихорадкахъ. Для наливки изъ дубровки требуется 1 или 2 драхмы сухой травы на 6 унцій горячей воды.

Дубъ. Дубовые желуди чаще всего предписываютъ атрофическимъ, золотушнымъ, рахитическимъ дѣтямъ, а также противъ блѣдной немочи, неправильныхъ мѣсячныхъ кровей, хроническаго поноса, перемежающейся лихорадки и такъ называемой нервности. Дубовые желуди употребляются только въ жаркомъ состояніи вмѣсто обыкновеннаго кофе. Но большіе приемы или продолжительное ихъ употребленіе вредно. Дубовая корка въ порошокъ и отваръ дается вмѣсто хины въ перемежающихся лихорадкахъ. Порошокъ коры, зашитый въ суконный рѣдкій мѣ-

шечекъ и вымоченный въ красномъ винѣ, совѣтуютъ прикладывать къ грыжѣ и носить его, придерживая бандажемъ. Водяной отваръ корки употребляется съ успѣхомъ въ болѣзняхъ, происходящихъ отъ слабости органовъ, а въ особенности въ мокротномъ почечуѣ, теченіи бѣлей и маточныхъ кровотеченіяхъ. Въ порошокъ дубовая кора дается отъ 20—30 гр.; для отвара полагается 1 унц. толченой коры на фунтъ воды или краснаго вина,—употреблять его по столовой ложкѣ. Истертыя въ порошокъ чашечки желудей даются вмѣсто хины по полдрахмѣ; ихъ полезно также употреблять противъ кроваваго долговременнаго поноса.

Дурманъ, дурнишникъ большой. Растеніе ядовитое, поэтому съ нимъ должно обращаться осторожно. Свѣжіе толченые листья дурмана прикладываются въ грудницѣ, для разведенія сгустившагося молока въ грудяхъ и смягченія твердыхъ воспалительныхъ опухолей железъ. Дурманъ въ особенности полезенъ въ судорогахъ, падучей болѣзни и сумашествіи, причѣмъ онъ употребляется во внутрь въ видѣ сгущеннаго сока или экстракта, приготовляемаго въ аптекахъ (extralum b' Stramonii). Этотъ же экстрактъ прикладывается къ раковиднымъ язвамъ и глубокимъ ожогамъ. Кромѣ того это средство одобряется въ глубокой меланхоліи и во всѣхъ нервическихъ болѣзняхъ, сопряженныхъ съ чрез-

вычайнымъ раздраженіемъ. Экстрактъ дурмана дается по $\frac{1}{2}$ 1 грана по 2, 3 и 6 разъ въ день.

Душица садовая. Полезна въ застарѣлой простудѣ, мокротной одышкѣ, нервныхъ, головныхъ припадкахъ, продолжительномъ насморкѣ, головокруженіи, звонѣ въ ушахъ, трясеніи членовъ и параличномъ расслабленіи, происходящихъ отъ старости. Наливку изъ нея, которую употребляютъ вмѣсто чаю, составляютъ изъ 1 драхмы верхушекъ и 4 унцій кипящей воды.

Дягиль, коровникъ, дягиль лѣсной, медвужьи пучки. Его употребленіе полезно въ болѣзняхъ, требующихъ возбужденія: въ слабости желудка, вѣтряной коликѣ, параличѣ, повальныхъ заразительныхъ болѣзняхъ и нервныхъ гнилыхъ горячкахъ; въ простудныхъ лихорадкахъ и ревматизмахъ въ мокротныхъ припадкахъ легкаго, застарѣломъ кашлѣ и одышкѣ. Сухой корень дается въ порошокъ отъ 20 гр. до полудрахмы, но лучше всего въ наливкѣ, полагая по 2 драхмы дягильнаго корня и касатика (или аира) на 8 унцій кипящей воды, которую, подсластивъ медомъ, принимать по 2 столовыхъ ложки. Лапландцы сухой корень жуютъ отъ зубной боли и замѣчено, что у нихъ никогда не бываетъ цинги, не смотря на холодный климатъ ихъ страны.

Дымянка, земляной дымъ, чистякъ, полевая рута, кокорышъ, дымница, земляные орѣшки, дымница орѣшистая, луковичная. Ее совѣтуютъ употреблять въ слабости желудка, желчной рвотѣ,

желтухѣ, цингѣ. На 12 унц. молочной сыворотки кладется 2 драхмы травы или горсть травы варятъ съ 2 фунтами пива, которое процѣдивъ и выжавъ, пьютъ по чайной чашкѣ нѣсколько разъ въ день. Сокъ дымянки, впускаемый въ глаза по каплѣ, разбиваетъ темную воду и укрѣпляетъ зрѣніе.

Дыня. Плоды дыни, при умѣренномъ ихъ употребленіи составляютъ весьма полезное для людей, одержимыхъ грудными и цинготными болѣзнями.

Дѣтская трава, кукушкины слезки, салея, бѣлый сатиръ дремликъ, царикъ, царь. Употребляется въ простыхъ и кровавыхъ поносахъ, сухоткѣ, чахоткѣ, изнурительныхъ лихорадкахъ, при внутреннихъ язвахъ, ссадинахъ кишекъ, въ мочерѣзѣ, худосочіи сильныхъ нагноеніяхъ, въ цинготныхъ язвахъ, долговременномъ простудномъ кашлѣ, въ дѣтской грыжѣ и рѣзѣ въ кишкахъ. Испытанное средство представляетъ порошокъ дѣтской травы для женщинъ, одержимыхъ изнурительнымъ сильнымъ кровотеченіемъ.

Е.

Ежевика или ожина, дереза, куманика. Ягоды съ пользою даются одержимымъ воспалительными лихорадками. Отваръ изъ листьевъ и ство-

ловъ полезенъ для полосканія въ жабѣ и гортанныхъ ранахъ, въ кровохарканіи, теченіи бѣлей и поносѣ. Корень можетъ быть съ пользою употребляемъ въ водяной. Полъ унціи сухаго корня кладется на 8 унцій воды для отвара.

Ель. Еловую смолу, растертую съ яичнымъ желткомъ, принимаютъ для изгнанія песка изъ мочевыхъ путей и въ простудномъ кашлѣ. Расплавленная съ саломъ смола служитъ мазью очищающею проказу, паршивые струпы. Одна вязкая смола вмѣсто пластыря прикладывается между лопатокъ, какъ отвлекающее средство, въ разныхъ головныхъ и глазныхъ болѣзняхъ. Еловая смола, сплавленная съ желтымъ воскомъ и свѣжимъ постнымъ масломъ, составляетъ пластырь, быстро заживляющій свѣжія раны.

Ж.

Жабникъ вредный, болотный, пѣтушья нога, жаботенный, прыщенецъ, купальница, жаб. остросочный, пѣкій лютикъ, жаб. полевой, куриная слѣпота, жабинецъ. По свидѣтельству нѣкоторыхъ врачей прикладываніе листьевъ ѣдкаго жабника въ застарѣлой ломотѣ къ болящимъ частямъ, исцѣляетъ ихъ радикально, даже въ случаѣ, если другія средства оказываются безсильными. Точно также они излѣчиваютъ зубную

боль, прикладывая ихъ къ плечу, соответствующему сторонѣ больнаго зуба. Толченые листья породъ жабника, прикладываемые снаружи, полезны, какъ въ членовой простудной ломотѣ, такъ и въ упорныхъ перемежающихся лихорадкахъ. Въ послѣднемъ случаѣ они прикладываются къ пястью руки, за нѣсколько часовъ предъ пароксизмомъ лихорадки и оставляются на немъ 8 или 12 часовъ. Отъ долговременной головной боли ихъ прикладываютъ къ затылку. Внутреннее въ большомъ количествѣ употребленіе вредно и даже смертоносно, какъ для людей, такъ и для животныхъ. Въ деревняхъ отваромъ остраго и огненнаго жабниковъ обмываютъ чесотку и дѣтскіе шолуди, но при этомъ нужна большая осторожность, такъ какъ трава жабника, оставаясь долго на тѣлѣ, разъѣдаетъ его и производитъ почти неизлѣчимыя раны. Противоядіемъ противъ отравленія жабникомъ служитъ чистая вода и сокъ щавеля, красной смородины, клюквы и даже уксусъ, разведенный водою.

Жабникъ чистотельный, лютикъ почечуйный, чистякъ меньшей. Корень и листья пьютъ въ отварѣ для открытія почечуя и разведенія густыхъ мокротъ. Снаружи вмѣстѣ съ коровьемъ масломъ прикладываются къ почечуйнымъ шишкамъ. Для отвара слѣдуетъ класть 1 унцію свѣжаго корня на 12 унц. сыворотки или похлебки и затѣмъ уваривать ту и другую до половины.

Выжатый сокъ даютъ по столовой ложкѣ черезъ каждые 4 часа.

Жабникъ, мощицъ пусиный, пусиная пажить, серебрянникъ, молка. Употребляется въ легочномъ нарывѣ, чахоткѣ, теченіи бѣлей, кровотеченіяхъ. Выжатый сокъ изъ всего растенія даютъ по столовой ложкѣ предъ лихорадочнымъ ознобомъ, также въ кровохарканіи и для изгнанія песка изъ мочевыхъ путей. Выжатый изъ свѣжаго серебрянника и зеленой ржи сокъ считается вѣрнымъ средствомъ для излѣченія каменной болѣзни. Для внутренняго употребленія горсть травы наливаютъ 6—8 унцій кипятка и, подсластивъ, принимаютъ по 3 унціи нѣсколько разъ въ день. Для отвара 1 унція кладется на фунтъ воды.

Жеруха огородная, кресъ садовый. Молодая трава съ щавелемъ и цикоріемъ служитъ вмѣсто салата полезнаго для цинготныхъ. Выжатый сокъ даютъ по двѣ унціи съ сывороткою. Этимъ средствомъ производили коренное излѣченіе цинготныхъ-разслабленныхъ. Кромѣ того выжатый сокъ креса полезенъ еще въ мокротныхъ брюшныхъ заваляхъ и каменной болѣзни, а сѣмя въ водяной. При этомъ сѣмя толкутъ и даютъ больнымъ по 1 драхмѣ съ медомъ.

Живучка кровельная, молодиль большой, дикій чеснокъ, очитокъ, дикіе артишоки. Сокомъ этого растенія, смѣшаннымъ съ медомъ, мажутъ во рту: молочницу, трещины на языкѣ воспаленныя

десны у дѣтей. Этимъ же сокомъ мажутъ трещины на сосцахъ и воспалительную грудницу, угрожающую ракомъ и мокнушія язвы. Сокъ, смѣшанный съ равною частью виннаго спирта, дается съ пользою въ хроническихъ конвульсіяхъ и падучей болѣзни. Имъ же примачиваютъ рожу, превратившуюся въ язвы, ногтеду и протираютъ лицо для истребленія веснушекъ. Выжатый сокъ дается внутрь по 1 унц. нѣсколько разъ въ день.

Живуецъ, стелющийся ломоносъ, бородавочница. Его употребляютъ въ застарѣлой венерической болѣзни, ночныхъ боляхъ костей и костяныхъ опухоляхъ, въ мокротной долговременной чесоткѣ, жестокой головной боли, меланхолии. Снаружи, толченая свѣжая трава прикладывается для очищенія грибовидныхъ венерическихъ, костоѣдныхъ и раковыхъ язвъ. Для наливки берется цвѣтной травы отъ 2 до 3 драхмъ на фунтъ горячей воды, которую, вскипятивъ разъ въ закрытомъ сосудѣ и процѣдивъ, даютъ по 4 унціи 2, 3 или 4 раза въ день. Употреблять также порошокъ изъ сухой травы и цвѣтовъ, съ двойнымъ количествомъ сахара по 3 грана 3 раза въ день, увеличивая приемы до 10 гранъ. Снаружи употребляется въ видѣ примочки и присыпки.

Журавики, журавлина, клюква. Употребляется въ воспалительныхъ лихорадкахъ, желчныхъ и гнилыхъ горячкахъ, но въ особенности въ цин-

гѣ. Въ этихъ случаяхъ употребляются ягоды клюквы, — сокъ ихъ служитъ прохладительнымъ питьемъ. Пропорція: 2 унціи сока на фунтъ воды.

3.

Завязникъ стоячій, узикъ. Отваръ корня узика полезенъ во всѣхъ болѣзняхъ, требующихъ сильнѣйшихъ вяжущихъ средствъ, именно: въ сильныхъ мѣсячныхъ кровотеченияхъ, поносахъ или лихорадкахъ. Какъ наружное средство, въ видѣ полосканья и примочки его рекомендуютъ: въ цинготной расслабленности десенъ и шатаніи зубовъ, опаденіи гортаннаго язычка: слабости членосоединеній, выпаденіи внутренностей и дѣтскихъ грыжахъ. Отваръ составляется изъ 3 драхмъ корня и 6 унц. воды.

Заячья капуста, молодилъ саймачій, толстолистная капуста, скрипулъ. Употребляется въ цингѣ, сильныхъ мѣсячныхъ кровотеченияхъ, поносахъ и отъ глистовъ. Снаружи служитъ хорошимъ средствомъ отъ мозолей; при продолжительномъ прикладываніи листьевъ мозоль болѣетъ, теряетъ чувствительность и отпадаетъ. Выжатый сокъ изъ всего растенія даютъ съ сывороткою по унціи и больше.

Заячій щавель, кислица. Употребляется въ цингѣ, желчныхъ и гнилыхъ горячкахъ. Снаружи толченые листья прикладываются къ золотушнымъ и др. злокачественнымъ язвамъ. Сокъ кислицы, прибавляемый къ питью, полезенъ въ меланхолии, сумасшествіи, воспаленіи мозга и сильномъ волненіи крови. Для внутренняго употребленія также варятъ горсть свѣжей травы въ фунтъ похлебки, или наливъ на полъ-унціи ея 12 унцій молока, кипятятъ его и, процѣдивъ, пьютъ полученную сыворотку въ вышеупомянутыхъ болѣзняхъ по чайной чашкѣ.

Зетробой. Народъ употребляетъ его въ чахоткѣ, кровохарканіи и кровавомъ мочетеченіи, брюшныхъ завалахъ, трясеніи членовъ и меланхолической задумчивости. Какъ наружное средство быстро заживляетъ раны и уничтожаетъ опухоли, происшедшія отъ ушибовъ. Полъ-унціи цвѣточныхъ верхушекъ кладутъ на 6 унцій горячей воды и этотъ отваръ пьютъ вмѣсто чая. Употребляютъ и настойку, — она составляется изъ 2—3 горстей цвѣтовъ на бутылку простого вина.

Земляника, земляница, суница, полуница. Ягоды земляники полезно употреблять во всѣхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ. По нѣскольку фунтовъ въ день совѣтуютъ давать сумасшедшимъ и меланхоликамъ. Употребленіе ягодъ въ большомъ количествѣ излѣчиваетъ подагру, весьма полезно для страдающихъ ломотою, каменною болѣзнію

и цингою. Отваръ изъ листьевъ и корней земляники ($\frac{1}{2}$ унц. ихъ хорошенько кипятятъ въ фунтѣ воды), принимаемый по 2 столовыхъ ложки чрезъ 2 часа полезенъ: въ чревныхъ заваляхъ, желтухѣ, понссахъ, кровотеченіяхъ, сыпяхъ и бѣляхъ.

Змѣй, трава, клещеница, образки юрныя, сухотный корень, ааронова борода. Сокъ этого растенія очень ядовитъ, но корень клещеницы, послѣ неоднократнаго кипяченія въ водѣ теряетъ это свойство и изъ него можно послѣ этого получить бѣлую сладкую, очень питательную муку, изъ которой можно приготавливать вкусныя хлебки и хлѣбъ, что не мѣшаетъ принять къ свѣдѣнію на случай голодныхъ годовъ. Какъ лѣкарство корень клещеницы рекомендуется многими врачами за вѣрное средство противъ грудныхъ и брюшныхъ мокротныхъ болѣзней, сопряженныхъ съ завалами внутренностей, мокротной одышки, глистныхъ припадковъ, худосочія, долговременной хрипоты; перемежающейся лихорадки, застарѣлаго ревматизма и бездѣйствія нервной системы. Этотъ же корень есть испытанное средство въ астеническомъ блѣдноцвѣтіи и худосочіи, сопряженномъ съ слабостію пищеварительныхъ органовъ; порошкомъ его, смѣшаннымъ съ медомъ, въ приѣмъ до 30 гранъ, вылѣчивали страдавшихъ сухоткою, которые имѣли уже всѣ признаки чахотки. Изъ 8 золотниковъ порошка клещеницы съ двойнымъ коли-

чествомъ свѣжей кислицы, растертыхъ съ медомъ на подобіе густаго тѣста, составляется кашка, поправляющая всякое худосочіе. Ее принимаютъ 3 раза въ день по чайной ложкѣ, запивая стаканомъ молочной сыворотки, смѣшанной съ двумя ложками хрѣноваго сока. Но вообще, внутрь корень клещеницы дается въ порошокъ отъ 10—15 гр. и даже до 20, съ магнезією, нашатыремъ и пр.; или же въ видѣ наливки, полагая $\frac{1}{2}$ унціи его, 6 унцій бѣлаго вина и принимаютъ ее по столовой ложкѣ. Снаружи, свѣжій корень, приложенный къ параличнымъ частямъ, возстановливаетъ ихъ чувствительность, въ видѣ припарки все растеніе употребляется съ большою пользою въ членовыхъ ломотныхъ боляхъ; порошкомъ корня присыпаются худосочныя язвы.

Змѣвникъ двудомный, кошачьи лапки. Употребляется вмѣсто чаю въ удушливомъ кашлѣ, кровохарканіи, чахоткѣ, простудной ломотѣ, сильныхъ кровотеченіяхъ, бѣляхъ, поносахъ, и въ глистныхъ припадкахъ. Змѣвникъ кустарный или комарникъ имѣетъ тѣ же свойства.

Золотень, золотушникъ, золотая роза. Растетъ по лѣсамъ. Съ пользою употребляется въ каменной болѣзни почекъ и мочеваго пузыря, чахоточной лихорадкѣ, кровавомъ мочеиспращеніи, водяной болѣзни; при поврежденіи дѣтородныхъ частей и трудныхъ родахъ. Для наливки щепоть или двѣ травы наливаютъ 8 унцій горячей воды;

2 или 3 драхмы сухой травы наливаютъ бѣлымъ виномъ. Даютъ чрезъ часъ по столовой ложкѣ, особенно эта наливка полезна въ камерной болѣзни.

Зоря. Зорьный корень особенно рекомендуютъ въ маточныхъ болѣзняхъ, при неправильномъ мѣсячномъ и родовомъ кровоочищеніи, для облегченія ослабѣвшихъ роженицъ, и удобнѣйшаго разрѣшенія въ трудныхъ родахъ. Зорья трава, употребляемая въ баняхъ, ваннахъ, припаркахъ и клистирахъ, полезна для утоленія боли въ животѣ и въ другихъ припадкахъ, случающихся послѣ родовъ. Настойка листовъ и сѣмянъ, употребляемая внутрь утоляетъ судороги спазмы и истерическіе припадки. Для наливки 2 драхмы корня кладутся на 6 унц. горячей воды или бѣлаго вина. Въ порошокъ приемы его достигаютъ до $\frac{1}{2}$ драхмы. Выжатый сокъ изъ листовъ, въ приемахъ отъ 1 до 3 унц., есть лучшее кровогонное средство. Водка, настоянная корнями и сѣменами зори, употребляемая предъ сномъ и ужиномъ по рюмкѣ, укрѣпляетъ желудокъ и, особенно полезна для меланхоликовъ, склонныхъ къ вѣтрамъ, спазмамъ и для одержимыхъ глистами.

И.

Ивановъ цвѣтъ, златоцвѣтъ, стлцвѣтъ, воловье око, бѣлица, водолазъ. Его употребляютъ съ пользою въ удушьяхъ, грудныхъ и мокротныхъ болѣзняхъ, чахоткѣ. Точно также въ чесоткѣ и вообще въ кожныхъ нечистыхъ сыпяхъ. Толченую траву кладутъ на больные зубы. Для наливки берутъ горсть свѣжей травы на 10 унц. воды и увариваютъ, пока останется $\frac{1}{2}$ ф. жидкости. Выжатый затѣмъ сокъ даютъ по столовой ложкѣ.

Истодъ. Употребляется преимущественно въ грудныхъ астеническихъ болѣзняхъ, въ мокротной чахоткѣ, судорожномъ кашлѣ, язвахъ легкаго, водяной болѣзни, ломотѣ, грудномъ колотьѣ. Въ мѣстныхъ грудныхъ болѣзняхъ, соединенныхъ съ кровохарканіемъ, сухоткою и чахоткою даютъ отваръ изъ 3 унц. корня, отваренная въ 3 ф. воды до половины, по чайной чашкѣ 3 раза въ день. Въ порошокъ корень дается отъ $\frac{1}{2}$ до 1 драхмы, два или три раза въ день. Для отвара берется 1 унц. на 2 ф. воды—увариваютъ, пока останется половина жидкости, процеживаютъ ее и даютъ по чайной чашкѣ нѣсколько разъ въ день.

К.

Калина. Варенныя ягоды съ медомъ употребляютъ отъ простуднаго кашля, хрипоты, удушья и поноса, въ простудныхъ лихорадкахъ и водяной болѣзни. Осиплость быстро проходитъ, если на ночь пить по стакану теплаго калиннаго отвара, подслащеннаго мятнымъ сиропомъ.

Калужница, курслѣтъ болотный. По сильной остротѣ и ядовитому дѣйствию этого растенія всего лучше не вѣря въ его цѣлительныя свойства, отказаться отъ его медицинскаго употребленія.

Камчадалка одуванчикъ, попово жуменцо, кульбаба, хасанъ, цикорій дикій, попова скуфья, плтшивецъ. Его слѣдуетъ употреблять въ желтухѣ, упорныхъ лихорадкахъ, начальной водяной болѣзни и отекахъ ногъ, а также въ лишаяхъ, золотухѣ и въ начальной чахоткѣ. Клистиры изъ одуванчика полезны въ меланхолии и ипохондрическихъ припадкахъ. Свѣжій корень и толченныя листья съ большою пользою прикладываются къ твердымъ опухолямъ, для ихъ разведенія и разнороднымъ нечистымъ ранамъ, для заживленія. Выжатый сокъ изъ всего растенія по 2 унц. въ теченіе нѣсколькихъ дней сряду дается вмѣстѣ съ мясною похлебкою. Или: 2—3 унц. травы и корня варятъ въ 3 ф. воды, пока

останется половина жидкости; прибавивъ къ отвару 2 яичныхъ желтка, употребляютъ его ежедневно по 2 унц. Сокъ изъ всего растенія, превращенный посредствомъ броженія въ спиртную жидкость, принимаютъ противъ угреватости и красныхъ пятенъ на лицѣ а также въ худосочной чесоткѣ, изнурительной тихой лихорадкѣ, сухоткѣ, каменной болѣзни и долговременной желтяницѣ. Принимать ежедневно отъ 3 до 4 унц.

Капуста огородная или кочанная. Свѣжая сваренная съ изюмомъ въ похлебкѣ полезна въ мокротномъ кашлѣ, хрипотѣ, начальной чахоткѣ и каменной болѣзни. Листы, сваренные въ бѣломъ винѣ весьма полезны въ застарѣлыхъ язвахъ; толченныя свѣжіе листья прикладываются къ шелудивымъ струпамъ у дѣтей. Совѣтуютъ распаренныя листья прикладывать родильницамъ къ грудямъ, или излишнемъ теченіи молока, или сгущеніи его въ творогъ. Въ запорахъ, даже въ ущемленной грыжѣ отваръ служитъ лучшимъ промывательнымъ средствомъ. Капустный рассоль полезенъ въ водяной болѣзни и для примочки гнилыхъ язвъ; препятствуетъ распространенію антонова огня, пользуется отъ ожоги.

Касатикъ болотный, сабельникъ. Сокъ, выжатый изъ корня, употребляется въ водяной болѣзни, противъ круглыхъ глистовъ и зоба, при которомъ даютъ этотъ корень жевать, прикладывая въ то же время снаружи толченый корень 50—60 дней. Корень положенный на больной

зубъ, утоляетъ боль. Сокъ дается съ какими-нибудь жидкостями отъ 1—4 драхмъ. Сухой корень въ порошокъ въ поносахъ и кровотеченіяхъ принимается отъ 20 гр. до $\frac{1}{2}$ драхмы.

Кашка, тысячелистникъ, цулявица, пижма, душистая греча, рябинка, деревей, кровавикъ, растиральникъ, чахотная трава. Отваръ тысячелистника употребляютъ противъ кровавой мочи и маточнаго кровотечения. Въ Италіи поляне употребляютъ его противъ перемежающейся лихорадки, а также для способствованія геморроидальнымъ кровотечениямъ и мѣсячному отдѣленію. Отваръ тысячелистника, говорятъ, есть превосходное средство отъ скарлатины, приноситъ дѣйствительную помощь въ завалахъ желудка, судорожныхъ боляхъ, послѣ родовъ. Выжатый сокъ изъ свѣжаго растенія, утверждаетъ одинъ докторъ, чрезвычайно полезенъ въ чахоткѣ и внутреннихъ язвахъ. вмѣсто отвара предпочтительнѣе пользоваться крѣпкимъ настоемъ, для полученія котораго на 16 унц. кипятку кладутъ 2 унц. сухой травы тысячелистника съ верхушками и, давъ ему отстояться полчаса въ закрытомъ сосудѣ, принимаютъ по чайной чашкѣ въ день.

Каштанъ дикій или конскій. Кора его безъ ущерба можетъ замѣнить хину. Дается въ видѣ порошка въ размѣрѣ до $1\frac{1}{2}$ драхмы чрезъ 4 часа. Обжаренные плоды и употребляемые въ видѣ кофе одобряютъ въ астеническихъ кровоте-

ніяхъ, особенно маточныхъ и почечуиныхъ; въ долговременныхъ поносахъ, теченіи бѣлей; а также въ мокротномъ кашлѣ и чахоткѣ того же рода.

Кислица. Водяная наливка листьевъ, употребляемая разъ въ день, какъ чай, помогаетъ въ цингѣ, продолжительныхъ желчныхъ, перемежающихся лихорадкахъ.

Кишинецъ, коляндръ. Употребляется въ слабости желудка, пученіи живота отъ вѣтровъ, истерикъ и другихъ нервныхъ болѣзняхъ. Употребленіе его въ винной наливкѣ нерѣдко излѣчиваетъ лихорадки. Кишинецъ также помогаетъ при разстройствѣ мѣсячныхъ кровоочищеній. Для наливки 2 или 4 драхмы наливаются 6 унц. горячей воды или бѣлаго вина.

Кленъ, некленъ, пакленъ. Отваръ молодыхъ побѣговъ полезенъ противъ желтухи, цинги и грудныхъ припадковъ. Онъ готовится изъ 2 горстей сочныхъ побѣговъ и фунта воды, кипятятъ пока останется 8 унцій жидкости (т. е. пока испарится $\frac{1}{3}$ оной). Такое же благотворное дѣйствіе имѣетъ и сокъ кленовый, который течетъ весною изъ надрѣзовъ на стволѣ клена. Кленовыя листья и побѣги, отваренные въ виноградномъ винѣ прикладываются къ больнымъ глазамъ, при воспаленіи ихъ.

Колокольчики оксамитъ, орлики голубки или павлинья очки; водосборъ. Корень этого растенія, Лѣчебникъ-Травникъ.

принимаемый въ порошокъ съ виномъ (1 драхму на стаканъ вина) излѣчиваетъ желтуху, особенно если къ корню оксамита прибавить нѣсколько шафрана.

Колосниця мѣстная, лѣсная буквица, змѣиная трава, змѣевникъ. Въ видѣ наливки (1 драхма травы съ цвѣтными верхушками на 4 унц. горячей воды или бѣлаго вина) она полезна: въ падучей болѣзни, запорѣ, мѣсячныхъ и родовыхъ кровей, обморокахъ и истерическихъ припадкахъ. Снаружи толченая трава прикладывается къ язвамъ и ранамъ для заживленія и очищенія ихъ.

Колосниця годовая имѣетъ тѣ же свойства *конопля*. Пенька или конопляная пакля, проваренная въ зольномъ щелокѣ, или просто съ золою, при прикладываніи къ нижней части живота, можетъ служить припаркою, сильно гонящею мѣсячныя крови. Молоко конопляныхъ сѣмянъ даютъ пить роженицамъ для ускоренія родового очищенія, усиленія отдѣленія грудного молока, и въ желтухѣ. Для ускоренія высыпанія оспы наружу нѣкоторые даютъ пить больнымъ молочную сыворотку, вареную съ коноплянымъ толченнымъ сѣменемъ, полагая послѣдняго по пригоршнѣ на кувшинъ сыворотки. Эмульсія коноплянаго сѣмени, для приготовления которой $\frac{1}{2}$ унціи сѣмени растираютъ съ 4 унц. холодной воды, — составляетъ хорошее побочное средство

при бѣляхъ и венерическомъ истеченіи сѣмени, простудномъ кашлѣ и желтухѣ.

Корень ластовочный, стручечникъ, чортова борода, чортова зелье. Весьма многіе медики съ успѣхомъ употребляли ластовочникъ противъ заваловъ, водяной болѣзни и скрытой золотухи. Для отвара берутъ 4—8 драхмъ листьевъ на фунтъ воды.

Крапива большая. Молодую крапиву весною варятъ въ кушаньяхъ, при этомъ она служитъ кровоочистительною пищею; полезна въ такомъ видѣ для слабогрудныхъ, сухотныхъ и имѣющихъ склонность къ чахоткѣ. Выжатый сокъ изъ свѣжей крапивы полезенъ во всѣхъ кровоточеніяхъ, а особенно въ кровохарканіи, кровавой мочѣ, чахоткѣ, желтухѣ, непостоянныхъ ломотахъ и цинготныхъ кровоточеніяхъ. Сѣченіе крапивою полезно для возбужденія утопшихъ, такъ какъ можетъ возстановить движеніе крови. Наливку составляютъ изъ горсти крапивы и 6 унцій горячей воды; принимаютъ ее по 2 унц. нѣсколько разъ въ день.

Крапива жгучка употребляется отъ глистовъ; застарѣлаго кашля, кровавой мочи воспалительнаго мочерѣза. Для отвара полъ-унціи варятъ въ 12 унціяхъ воды или молока пока останется 10 унц. жидкости.

Крапъ, марена. Растеніе воздѣлываемое, ради добыванія изъ него краски. Корень марены не разъ употребляли съ успѣхомъ противъ размяг-

ченія костей, опухоли составовъ, брюшныхъ заваловъ, упорной желтухи, запора кровей; противъ худосочія, блѣдной женской немочи, дѣтской сухотки, мокротныхъ болѣзней легкаго, поясничной боли отъ надсады и для истребленія багровыхъ или красныхъ прыщей на лицѣ. Для отвара унція корня кладется на 1 ф. воды, кипятятъ пока останется 8 унц. Процѣдивъ и подсластивъ даютъ дѣтямъ по 2 или 3 столовыхъ ложки на приемъ нѣсколько разъ въ день. Противъ англійской болѣзни весьма полезенъ слѣдующій отваръ: берутъ по пол-унціи корня марены и вербовой корки, истолокши, варятъ въ 2 ф. воды, пока останется 12 унцій и затѣмъ прибавляютъ 1 драхму очищенной воды. Въ порошокъ корень марены взрослымъ дается отъ $\frac{1}{2}$ до 1 драхмы черезъ каждые три часа, — дѣтямъ даютъ порошокъ въ видѣ каши, смѣшавъ его съ медомъ по чайной ложкѣ 3 или 4 раза въ день.

Красавица, сонная одурь, пеньи вишни, вѣтряныя ягоды. Растеніе въ всѣхъ своихъ частяхъ весьма ядовитое, особенно корень. Поэтому при употребленіи его во внутрь нужно поступать весьма осторожно. Его употребляютъ главнымъ образомъ противъ нервныхъ страданій и особенно противъ невралгій и нервного раздраженія, противъ мигрени, судорожныхъ страданій эпилепсіи, столбняка, пляски св. Витта, водобоязни; а также противъ одышки, коклюша, чахотки; нако-

нецъ противъ душевныхъ болѣзней. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, не производя кореннаго излѣченія, сонная одурь составляетъ лишь хорошее палліативное средство по своему успокоительному, болеутолительному и противосудорожному дѣйствию. Внутрь даютъ сонную одурь въ видѣ порошка изъ листьевъ или корня въ размѣрѣ 1—3 гр. въ день, мало по малу возвышая приемы до 6—8 гр. — взрослымъ; младенцамъ же $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ гр. и никогда болѣе 2—3 гр. Къ этому нужно прибавить, что нѣкоторые доктора считаютъ сонную одурь, надежнѣйшимъ средствомъ противъ водобоязни, происшедшей отъ укушенія бѣшенымъ животнымъ и особенно собакой. Снаружи свѣжіе толченые листья полезны въ раковыхъ язвахъ. Бывали случаи, что прикладываніемъ ихъ многіе исцѣлились отъ рака. Листы красавицы, употребляемые въ видѣ припарки разводятъ твердыя опухоли.

Кротовикъ, дудра ползучая, плющикъ, душистый кудри. Народная медицина признаетъ его за одно изъ лучшихъ средствъ противъ застарѣлой простуды, упорнаго кашля, мокротной чахотки, кровохарканія, дѣтской сухотки и водяной болѣзни, въ желтухѣ и каменной болѣзни. Для приготовления наливки въ 4 унц. кипятку кладутъ щепоть травы.

Кувшинка бѣлая, водяныя маковки, лататы, кувшинка желтая, кубышечки, водяной лягушникъ. Отваръ корня желтоцвѣтныхъ кувшинчиковъ

составляетъ хорошее мягчительное, прохладящее и притупляющее средство, полезное въ воспалительномъ задержаніи мочи, мочерѣзѣ, бѣляхъ, въ воспаленіи почекъ и другихъ внутренностей. Изъ цвѣтовъ и плодовъ кувшинки дѣлается наливка, утоляющая жаръ и жажду и наводящая сонъ. Для отвара: 1 или 2 унц. корня желтой кувшинки кладется на фунтъ воды, для наливки горсть бѣлыхъ или желтыхъ свѣжихъ цвѣтовъ наливаютъ 8 унц. кипятка.

Курослѣпа малый, очной цѣтѣ, умъ да разумъ. Его хвалятъ въ желтухѣ, меланхолии и сумашествіи. Выжатый изъ свѣжаго растенія сокъ и смѣшанный съ медомъ, залѣчиваетъ глазныя раны, очищаетъ пятна, исправляетъ плохое зрѣніе и уничтожаетъ первоначальную слѣпоту. Этотъ же сокъ рекомендуется какъ дѣйствительное средство противъ одышки мокротнаго свойства и чахотки, послѣдовавшей отъ воспаления легкихъ. Снаружи порошкомъ этой травы полезно присыпать нечистыя язвы и уязвленія, происшедшія отъ укушенія бѣшеными собаками. Внутри дается въ видѣ порошка (по 20 гр. 4 раза въ день) или въ видѣ наливки, для приготовления которой на фунтъ горячей воды берутъ 2 драхмы курослѣпа.

Курятникъ волючій, ладанъ лѣсной. Употребляется въ истощительной чахоткѣ въ соединеніи съ сладкогорькимъ алтейнымъ корнемъ и солодкою. На горсть цвѣтовъ ладана кладутъ полгорсти

алтейнаго и такое же количество солодковаго. Пьютъ какъ чай, два раза въ день.

Л.

Лавруша, волчникъ. Кора этого растенія, будучи приложена къ кожѣ, имѣетъ дѣйствіе, подобное дѣйствію мушки, только нѣсколько слабѣе. Нѣкоторые доктора свидѣтельствуютъ, что кора одного вида волчника, именно, волчника метелчатаго, можетъ быть съ успѣхомъ употребляема противъ болѣзней кожи, хроническихъ ревматизмовъ, глухоты, золотухи, наслѣдственнаго сифилиса и болѣзней костной системы. Съ этою цѣлію ее употребляютъ въ видѣ порошка, наливки, сиропа и помады.

Лавровишня. Извѣстна по приготовляемымъ изъ нея лавровишневымъ каплямъ. Лавровишня съ пользою можетъ быть употребляема въ ипохондрическихъ припадкахъ, меланхолии и сумашествіи, въ случаяхъ сердцебіенія и стѣсненія въ груди, а также при внутреннихъ аневризмахъ. Точно также лавровишневую воду рекомендуютъ въ перемежающихся лихорадкахъ, кровохарканіи и для уничтоженія золотушныхъ опухолей железъ. Простолоудины свѣжіе лавровые листочки по 3—4 кладутъ на кувшинъ парного молока и, настоявъ, пьютъ по стакану отъ чахотки. При-

нимаютъ лавровишневую воду по нѣскольку разъ въ день, постепенно увеличивая приемы даже до 60 капель.

Ландыть майскій, л. многоколѣчатый, соломонова печать, купена. Ягоды майскаго ландыша, созрѣвающія въ сентябрѣ, имѣютъ противолихорадочныя свойства и полезны въ падучей болѣзни. Употребляется ландышъ кромѣ того въ головныхъ припадкахъ, истерическихъ мокротныхъ обморокахъ, застарѣломъ насморкѣ, простудныхъ ушныхъ, глазныхъ и личныхъ боляхъ. При апоплексическомъ ударѣ даютъ нюхать свѣжіе высушенные цвѣты, истертые въ порошокъ. Для отвара берутъ 1 драхму травы на 4 унц. кипящей воды, его въ упомянутыхъ болѣзняхъ пьютъ вмѣсто чаю; причеиъ весьма также полезна и винная ландышевая настойка. Сушенныя ягоды отъ 10—20 гр. въ видѣ порошка даютъ предъ лихорадочными припадками, 2 или 3 раза въ день.

Отваръ корня многоколѣчатаго ландыша употребляется противъ кашля и при теченіи бѣлей. Отваръ листьевъ полезенъ для омыванія чесотки и примачиванія пятенъ, оставшихся послѣ оспы и кори. Для отвара на $\frac{1}{2}$ драхмы корня берется фунтъ воды или молока. Пьютъ по чайной чашкѣ.

Лебеда садовая. Выжатый изъ листьевъ и очищенный сокъ полезенъ въ воспаленіи горла и кишекъ. Нѣкоторые врачи совѣтуютъ употреблять лебеду въ пищу страдающимъ брюшными

завалами, желтухою и частыми запорами. Сѣмена садовой лебеды, принятыя внутрь до 1 драхмы, возбуждаютъ рвоту и слабятъ, въ меньшемъ количествѣ почитаются хорошимъ средствомъ противъ англійской болѣзни. Свѣжіе листья лебеды прикладываются къ ногтямъ и занозамъ.

Ленъ. Крѣпкій отваръ или наливку льнянаго сѣмени даютъ въ болѣзняхъ мочевыхъ путей, особенно въ воспалительномъ мокротномъ теченіи, хрипотѣ, простудномъ кашлѣ, воспаленіи легкихъ, одышкѣ и трудномъ отдѣленіи мокротъ. Снаружи, въ видѣ полосканья, подслащенного медомъ, наливку сѣмянъ полезно употреблять въ жабѣ и молочницѣ во рту. Въ видѣ промывательнаго она смягчаетъ боль въ кишкахъ, рѣзы и частыя потуги, нерѣдко соединенныя съ кровавымъ поносомъ. Припарка изъ толченыхъ сѣмянъ съ молокомъ считается лучшею припаркою въ твердыхъ воспалительныхъ опухоляхъ, особенно нарывахъ, паховикахъ и пр. Для наливки: $\frac{1}{2}$ —1 унц. сѣмени на 2 ф. кипяченой воды, которую кипятятъ и процеживаютъ. Льняное масло употребляется отъ глистовъ всякаго рода, а также въ свинцовой коликѣ и сухомъ запорѣ, причеиъ масло даютъ внутрь по нѣсколько унцій, смѣшавъ съ медомъ. Съ свѣжимъ яичнымъ желткомъ льняное масло полезно въ кровохарканіи, легочномъ нарывѣ, гнойной чахоткѣ, кровавомъ поносѣ и рѣзи въ кишкахъ. Смѣшанное съ камфорнымъ спиртомъ оно полезно какъ втираніе, при боляхъ

поясницы, живота, въ бокахъ и пр. Внутрь льняное масло употребляютъ нѣсколько разъ въ день по 1 или 2 унц. Изъ $\frac{1}{2}$ ф. свѣжаго масла и 4 яицъ составляется очень хорошая мазь отъ ожогъ.

Липа. Наливка изъ цвѣтовъ одобряется въ грудныхъ припадкахъ, спазмахъ, боляхъ головы, обморокахъ и судорожныхъ болѣзняхъ. Липовый чай полезенъ также для ипохондриковъ и людей, склонныхъ къ удару. Наливкою липовыхъ цвѣтовъ вылѣчивали застарѣлую падучую болѣзнь. Сѣмена, истертая въ порошокъ и нюхаемые по нѣскольку разъ въ день, унимаютъ носовое кровотеченіе. Для наливки, $\frac{1}{2}$ цвѣтовъ на 6 унц. кипятку пьютъ какъ чай, съ медомъ или сахаромъ.

Лукъ. Употребляемый въ кушаньяхъ онъ полезенъ для лицъ страдающихъ водяною и каменною болѣзнію. Въ этомъ случаѣ больнымъ даютъ выжатый сокъ, подсластивъ его сахаромъ или медомъ по нѣскольку унцій въ день. Печеный лукъ употребляемый съ масломъ, полезенъ отъ кашля мокротной одышки и другихъ грудныхъ припадковъ. Лукъ настоенный въ бѣломъ виноградномъ винѣ также полезенъ въ водяной и каменной болѣзняхъ и кромѣ того унимаетъ боль поясницы, истребляетъ мелкихъ заднепроходныхъ глистовъ. Выжатый сокъ, вводимый въ ухо посредствомъ напитанной имъ ваты, пользуется ушную простудную боль, уничтожаетъ звонъ и шумъ въ ушахъ. Смѣшавъ лукъ съ медомъ, мажутъ глаза при тусклости зрѣнія и при начальной слѣпотѣ. Про-

тивъ глухоты, ушной ломоты и вообще ушныхъ болѣзней очень хвалятъ слѣдующее средство. Вынувъ средину луковицы, наполняютъ пустоту тминомъ; составленную такимъ образомъ луковицу испечь въ золѣ, послѣ чего выжать изъ нея сокъ и имъ пользоваться. Кромѣ того печеный лукъ употребляется въ видѣ смягчительной и согрѣвающей припарки.

Лягушечный песокъ, нитчатка ручейная, тина ручейная, водяной мохъ. Свѣжая мокрая тина, прикладываемая къ ушибамъ, уничтожаетъ багровыя пятна и утоляетъ боль. Она же разводитъ шейныя золотушныя желѣзы и исцѣляетъ этого же рода язвы. Кромѣ того ее хвалятъ въ долговременномъ кашлѣ и дѣтской сухоткѣ. Внутрь дается малолѣтнимъ въ порошокъ, съ молокомъ или медомъ отъ 20—40 гр. въ день. Отъ прибавленія къ ней ревеня дѣйствіе тины становится еще цѣлебнѣе; въ такомъ случаѣ, больнымъ, преимущественно золотушнымъ, слѣдуетъ употреблять порошокъ ревеня и тины утромъ и вечеромъ по 10 гранъ. Донскіе казаки употребляютъ тину какъ противоглистное средство. Даютъ ее въ порошокъ съ медомъ—взрослымъ $\frac{1}{2}$ 2 золотниковъ, дѣтямъ отъ $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ зол.

Лягушникъ, репейникъ. Отваръ корней его употребляется противъ болѣзни кожи и мочеваго пузыря. Отваръ листьевъ полезенъ, какъ желудочное и противо-лихорадочное средство. Сѣмена дѣйствуютъ кровочистительнымъ образомъ. Свѣжіе

листья прикладываются къ ранамъ для ихъ заживленія.

М.

Майоронъ кошачій, кошачья трава. Употребляется въ слабости нервной системы, истерикѣ, ипохондріи, упорномъ кашлѣ худосочіи, запорѣ кровей, водяной болѣзни, нервной горячкѣ, (turhus). Внюхиваніе порошка майорона уничтожаетъ долговременный насморкъ и восстанавливаетъ обоняніе. Для водяной или винной наливки полагается 1—2 драхмы на 6 унц. жидкости. Порошокъ дается отъ 20—30 гранъ 3 или 4 раза въ день съ виномъ или медомъ въ видѣ каши.

Макъ бѣлый садовый, макъ бѣлунъ. Древніе врачи отваръ маковыхъ головокъ, подслащенный медомъ, давали съ пользою въ простудномъ кашлѣ и другихъ грудныхъ припадкахъ. Цвѣтная водяная или молочная наливка полезна отъ бессонницы, простуды, упорнаго кашля, колики въ животѣ и поносовъ. Маковое молоко даютъ съ пользою въ воспалительной лихорадкѣ, мочерѣзѣ, кашлѣ, хрипотѣ. Для отвара $\frac{1}{2}$ унц. маковокъ кладутъ на фунтъ воды и кипятятъ пока останется 8 унц. жидкости. Маковое масло даютъ въ кори, при паденіи ея на внутренности.

Макъ красный, полевой, дикій мачокъ сходенъ по своимъ дѣйствіямъ съ предыдущей породой. Опій, добываемый изъ мака, можетъ почитаться однимъ изъ вѣрнѣйшихъ средствъ, но лишь паллиативныхъ, только успокаивающихъ; нѣтъ вещества, которое бы столь вѣрно производило сонъ и утоляло боль всякой степени. Но, говоря вообще, едва ли есть болѣзнь, противъ которой опій не могъ бы быть полезнымъ, но также и вреднымъ смотря по обстоятельствамъ.

Малина. Дѣйствіе ягодъ малины прохладительное, утоляющее жажду и потогонное. Употребляются онѣ въ воспалительныхъ лихорадкахъ, желчныхъ горячкахъ и цингѣ. Цвѣты полезны рожѣ и воспаленіи глазъ. Ягоды даются больнымъ въ большемъ или меньшемъ количествѣ по желанію. Смѣсь 3 унц. малиноваго сока и $\frac{1}{2}$ драхмы поташа составляетъ питье, особенно полезное для страждущихъ каменною болѣзнію.

Марь. Ея видъ: а) *марь благовонная*, б) *марь красная, цусиная лапка, лебеда дикая*, в) *марь кудрявецъ, лебеда душистая, Божій бытъ*, г) *марь трехуольная, цусиная лапа, корольки, собачья лебеда, дикій шпинатъ.* Она считается полезнымъ средствомъ въ слабости нервной системы, въ грудныхъ спазмахъ, одышкѣ, мокротномъ и гнойномъ кашлѣ. Наливка мари полезна въ истеріи, параличѣ ногъ, а особенно въ пляскѣ св. Витта. Все растеніе, въ видѣ водяной и винной наливки помогаетъ въ каменной болѣзни. Для отвара $\frac{1}{2}$

унц. травы кладутъ на 10 унц. кипятку и, подсластивъ пьютъ вмѣсто чаю съ молокомъ. Употребляютъ также порошокъ растенія съ медомъ въ видѣ каши, отъ 2 гр. по $\frac{1}{2}$ драхмы 2 или 3 раза въ день. Въ параличѣ употребляютъ спиртную настойку: унцію травы и 2 унц. алкоголя; даютъ отъ 20—40 капель Свѣжіе толченые листы треугольной мари прикладываютъ къ отекамъ опухолямъ и нечистымъ язвамъ, изъ которыхъ они извлекаютъ очень много матеріи. Въ глазныхъ сухихъ воспаленіяхъ полезна толченая трава этого растенія, смѣшанная съ свѣжимъ саломъ или коровьимъ масломъ. Эта мазь употребляется также въ чесоткѣ, лишаяхъ, ногтядѣ и болящихъ геморройныхъ шишкахъ.

Маточникъ, медновка, потогонная трава. Полезна въ желудочныхъ спазмахъ, рвотѣ, сердцебіеніи, истерическихъ припадкахъ, головокруженіи, блѣдной немочи, запорѣ кровей, боляхъ послѣ родовъ, простудной ломотѣ и параличныхъ ослабленіяхъ. Ножныя ванны до колѣнъ изъ теплой воды и питье теплаго настоя медовки по стакану, 3 или 4 раза въ день, помогаетъ открытію мѣсячнаго очищенія. Для наливки: 2 драхмы травы на 6 унц. воды или бѣлаго вина.

Медвѣжье ушко, царскій скипетръ, царская свѣча, коровьякъ, вербишникъ бѣлый. Отваръ листьевъ и цвѣтовъ хвалятъ въ кашлѣ, грудныхъ простудныхъ припадкахъ, чахоткѣ, кровавомъ поносѣ съ рвзью въ животѣ. Употребляется также въ

видѣ промывательнаго и припарокъ. Для наливки 1 унц. травы наливается 12 унц. кипятку; цвѣтовъ 1 или 2 драхмы для той же цѣли 4 унц. горячей воды; принимаютъ по чайной чашкѣ нѣсколько разъ въ день.

Медуница аптечная, пятнистая Употребляется въ грудныхъ припадкахъ, сухоткѣ, чахоткѣ, воспаленіи легкихъ, долговременномъ кашлѣ, хрипотѣ и завалахъ печени. Молодую свѣжую траву варятъ въ супахъ для больныхъ вышеозначенными болѣзнями, или же приготавливаютъ изъ сухой травы наливку (горсть травы на 6 унц. кипятку), которую пьютъ съ медомъ вмѣсто чаю. Снаружи свѣжая истолченная трава прикладывается для заживленія ранъ.

Можжевельникъ обыкновенный, яловецъ. Ягоды его всего чаще употребляютъ для усиленія отдѣленія мочи, какъ-то: при водянкѣ, ломотѣ, катарральныхъ страданіяхъ дыхательныхъ вѣтвей, мочевыхъ и половыхъ органовъ. 10—20 зрѣлыхъ ягодъ на пріемъ или ихъ наливка употребляютъ какъ народное средство противъ перемежающейся лихорадки, а также при недостаточномъ отдѣленіи мѣсячныхъ кровей. Для настойки ягодъ и древесины иногда вмѣсто воды берутъ вино или пиво. Должно пить всегда холодную жидкость, если желаютъ умножить отдѣленіе мочи.

Молочай болотный Млечный сокъ, истекающій изъ его стеблей, въ воздухѣ сгущается и высыхаетъ, образуя мелкія зернышки блѣдно желтаго

цвѣта, чрезвычайно острый, ѣдкій вкусъ. Врачи совѣтуютъ, растерши его съ свѣжимъ коровьимъ масломъ или саломъ, употреблять какъ мазь для очищенія шелудивыхъ струповъ, бородавокъ, мозолей и летучихъ огневиговъ. Сокъ изъ сорваннаго стебелька молочая, впускаемый въ гнѣющій зубъ, помогаетъ въ зубной боли, часто со всѣмъ прекращаетъ ее. Какъ примочку для костѣдныхъ язвъ и для растиранія парализованныхъ членовъ употребляютъ спиртную настойку молочая; для приготовления ея 1 унція сгущеннаго сока кладется на 8 унцій виннаго спирта. Даютъ ей настояться въ теченіи трехъ дней и процеживаютъ.

Молочай плащевый или круглолистный, м. ѣдкій, придорожный, солнечный. Отличаются подобными же свойствами. Въ отчаянной водяной болѣзни крестьяне даютъ 10—20 капель выжатаго сока; столовая ложка этого сока, растертая съ такимъ же количествомъ мелкоаго сахара и свѣжимъ яичнымъ желткомъ съ прибавленіемъ 3 столовыхъ ложекъ воды, составляетъ питье, принимаемое чрезъ 2 часа по ложкѣ для изгнанія семочной глисты.

Морковь огородная и лесная. Употребленіе ея приноситъ пользу во всѣхъ худосочныхъ болѣзняхъ; а также въ долговременной хрипотѣ, кашлѣ, чахоткѣ и брюшныхъ завалахъ. Морковный отваръ употребляютъ противъ запора мочи и мочеузда. Вываренный сокъ моркови, смѣшанный

съ равною частью меда, даютъ дѣтямъ, страдающимъ каменною болѣзнью по чайной ложкѣ, а взрослымъ по столовой. Дѣтямъ отъ мелкихъ глистовъ даютъ сырую морковь ѣсть на тощакъ. Морковное сѣмя помогаетъ истерическимъ женщинамъ, при остановкѣ у нихъ мѣсячныхъ и послѣродовыхъ кровей.

Снаружи свѣжая, толченая морковь, или истертая на теркѣ прикладывается къ раковиднымъ язвамъ, венерическимъ, золотушнымъ и гнилымъ цинготнымъ ранамъ; при чемъ она утоляетъ боль и мало по малу совершенно заживляетъ ихъ. Особенно цѣлительное дѣйствіе при излѣченіи раковыхъ язвъ морковь оказываетъ, если ее смѣшать съ травой пестраго омега. Для приготовления такой катаплазмы берется на 2 унц. тертой или толченой моркови 1 унц. омеговой травы и затѣмъ, катаплазма перемѣняется 2 или 3 раза въ день. Сѣмя дается въ порошокъ отъ $\frac{1}{2}$ до 1 драхмы 2 или 3 раза въ день. Противъ золотушнаго рака дѣйствуетъ съ большимъ успѣхомъ еще такое средство. Изъ фунта тертой свѣжей моркови, травы пестраго болиголова и зеленыхъ маковыхъ головокъ истолченныхъ въ мякоть, каждаго по 4 лота, дѣлается масса; перемѣняя ее раза 2 въ день, получаютъ хорошее нагноеніе и язва приходитъ въ заживленіе.

Мотодилъ, молодилъ, остросочный, перецъ дикій. Употребленіе его полезно въ цингѣ и упорныхъ 4-хъ дневныхъ лихорадкахъ, оканчивающихся

нерѣдко водяною болѣзнію. Снаружи свѣжая толченая трава прикладывается къ гнилымъ цинготныхъ и раковымъ язвамъ, злокачественному вереду, антонову огню и головнымъ шелудямъ. Для отвара горсть свѣжей травы кладется на фунтъ молока или пива которыя кипятятъ, пока останется половина жидкости; процѣдивъ, употребляютъ по небольшой чайной чашкѣ 2 или 3 раза въ день. Выжатый сокъ, смѣшанный по равной части съ виннымъ спиртомъ очень хорошо прекращаетъ антоновъ огонь.

Мохъ исландскій или грудной, его сурогаты, лишай печеночный, лишай вишневый, собачій мохъ, мохъ олений. Даютъ ихъ при легочной чахоткѣ, недостаточномъ пищевареніи, хроническомъ поносѣ, перемежающейся лихорадкѣ и коклюшѣ. Кроме того мохъ даютъ какъ средство укрѣпляющее силы больного. Въ порошокъ исландскій мохъ дается рѣдко; обыкновенно же употребляютъ его въ отварѣ, полагаятъ 1 унцію сухаго, крупно истертаго моха на 16 унц. воды, которую, увариваютъ пока останется 12 унц. жидкости, процѣдивъ, его пьютъ съ медомъ по чайной чашкѣ, каждые два часа.

Мохъ земляной, лишай собачій заслуживаетъ особаго вниманія въ томъ отношеніи, что онъ оказываетъ очень полезное дѣйствіе въ укушеніи бѣшенымъ животнымъ. Англійскіе врачи Соанъ и Гартлей составляли порошокъ отъ бѣшенства изъ 2 частей этого моха и 1 части пер-

ца и давали его на приѣмъ людямъ 1—2 золотниковъ; собакамъ и другимъ животнымъ 1—2 лотовъ.

Мухоморъ. Такъ какъ мухоморъ очень ядовитый грибъ, то употребленіе его съ лечебною цѣлью должно ограничиваться рамками почти одного наружнаго лѣкарства. Такъ, порошкомъ мухомора совѣтуютъ присыпать упорныя язвы, антоновъ огонь и гноеватые глазные прыщи. Простолюдины же употребляютъ мухоморъ для натиранія онѣмѣлыхъ и пораженныхъ параличемъ частей. Для этого собравъ мухоморовъ въ достаточномъ количествѣ, крошатъ и наполняютъ ими бутылку, которую закупоривъ, зарываютъ въ навозъ; по прошествіи нѣкотораго времени они распускаются въ слизистую жидкость, служащую для натиранія. Иногда къ этой слизи прибавляется равное количество виннаго спирта. Порошокъ готовится изъ корней мухомора такимъ образомъ. Корни собираютъ осенью и, отрѣзавъ части, находящіяся въ землѣ, сушатъ, затѣмъ растираютъ въ порошокъ, и сохраняютъ въ сухомъ мѣстѣ, въ плотно закупоренномъ стеклянномъ сосудѣ. Нашъ извѣстный докторъ Кашинскій утверждаетъ, что ему удалось исцѣлить падучую болѣзнь смѣсью изъ $\frac{1}{2}$ золотника корня высушеннаго мухомора, 2 золотн. вишневаго клея и 2 лотовъ медоваго уксуса, разведенныхъ 12 лотами чистой воды. Это

лѣкарство давалось имъ больному въ теченіе мѣсяца, по столовой ложкѣ чрезъ каждые 3 часа.

Мята болотная, употребляемая внутрь вмѣсто чаю (горсть травы на фунтъ кипятку), утоляетъ желудочную боль и сильно гонитъ мочу. Выжатый же сокъ въ приемахъ по столовой ложкѣ съ бѣлымъ виномъ гонитъ песокъ изъ мочевыхъ путей и помогаетъ отъ глухоты.

Таковыми же свойствами обладаютъ и *мята лесная или дикая и садовая*.

Мята кудрявая. Ее употребляютъ съ пользою въ слабости желудка, отвращеніи отъ пищи, рвотѣ, истерическихъ припадкахъ, астенической лихорадкѣ непомѣрной похотливости и бѣшенствѣ матки. Снаружи она прикладывается въ видѣ припарки къ ушибамъ, отекамъ, простуднымъ опухолямъ и груднымъ, происходящимъ отъ излишняго накопленія молока или отъ створоженія *онаго*, а также для разведенія холодныхъ опухолей; толченые листья, прикладываемые къ ранамъ, унимаютъ кровотеченіе, изгоняютъ червей, споспѣшествуютъ заживленію. Для наливки, которую пьютъ вмѣсто чаю по чашкѣ, на фунтъ кипятку кладется 1 унц. сухой травы. Эта же наливка служитъ также промывательнымъ и припаркою. Для разведенія опухолей къ горячей наливкѣ прибавляется немного мыла и молока и, напитавъ ею сложенное полотенце, перемѣняютъ ихъ при остываніи.

Н.

Наперсточная трава. Употребленіе наперстянки для лицъ, страдающихъ слабостью, значительной раздражительностью, особенно же неправильностью кровообращенія и органовъ его, употребленіе этой травы во внутрь требуетъ особенной предосторожности, во избѣжаніе дурныхъ послѣдствій для больного, такъ какъ наперстянка заключаетъ въ себѣ достаточно ядовитыхъ началъ.

Наперстянка принадлежитъ къ лучшимъ, полліативнымъ средствамъ при порокѣ сердца, умѣряя сокращеніе сердца и пульсъ. Ее употребляютъ также противъ кровотеченія (напр. изъ легкихъ), противъ одышки, сильнаго раздраженія въ кашлѣ и противъ легочной чахотки. Рекомендуютъ ее и при приливѣ, раздраженіи и воспаленіи, чтобы успокоить дѣятельность сердца и скорый пульсъ и чтобы уменьшить жаръ или возбужденіе нервной и душевной жизни. Какъ наркотическое (успокоительное) средство, ее употребляютъ предпочтительно предъ опиумъ, дурманомъ и пр., противъ нервныхъ страданій и душевныхъ болѣзней съ характеромъ возбужденія, противъ головной боли и т. п. Даютъ наперстянку въ плотномъ видѣ по $\frac{1}{2}$ —2 грана на

пріемъ, 2—4 раза въ день, осторожно увеличивая пріемъ, въ порошокъ и въ пилюляхъ. По большей части употребляютъ наливку въ пріемъ 20—35 гр. въ день. Для составленія этой наливки полагается 1 драхма сухой травы на 8 унц. кипятку, который процѣдивъ чрезъ $\frac{1}{4}$ часа прибавляютъ унцію мятной воды и каплю мятнаго масла; даютъ чрезъ два часа по столовой ложкѣ. Въ водяной болѣзни съ успѣхомъ даютъ сѣмя наперсточной травы, въ порошокъ, такимъ же образомъ какъ и сухую траву т. е. $\frac{1}{2}$ —2 гр. 2—4 раза въ день.

При употребленіи нужно, какъ сказано, соблюдать осторожность и въ случаѣ, если появляется у больного сильная рвота, желудочныя спазмы, поносъ, конвульсіи, холодный потъ и обмороки, должно тотчасъ же уменьшить пріемы наперстянки.

Нардъ, увѣчная трава. Употребленіе ея полезно въ слабости нервовъ, частыхъ обморокахъ, маточныхъ припадкахъ, головокруженіи, параличѣ, трясеніи членовъ, тяжеломъ слухѣ, тупомъ зрѣніи, слабой памяти или забывчивости. Ванны изъ нарда полезны въ англійской дѣтской болѣзни и блѣдной немочи, послѣдовавшей отъ остановки мѣсячнаго очищенія вслѣдствіе простуды. Для наливки: полгорсти цвѣтныхъ верхушекъ или 1 драхму цвѣтовъ наливаютъ 1 унц. кипятку, пьютъ вмѣсто чаю.

О.

Овесъ. Отваръ овсянной крупы служитъ прохладительнымъ питьемъ въ воспалительныхъ лихорадкахъ и горячкахъ; съ прибавленіемъ небольшого количества селитры, этотъ отваръ полезенъ въ лихорадкахъ, при большихъ ранахъ и ушибахъ, переломахъ костей и т. п. воспалительныхъ опухоляхъ. Овсяная каша, вареная съ изюмомъ или съ молокомъ, дается съ пользою кашляющимъ, сухотнымъ и склоннымъ къ чахоткѣ. Снаружи цѣльный овесъ, подогрѣтый или поджаренный на сковородѣ, прикладывается въ мѣшечкахъ для утолненія простуднаго колотья, брюшныхъ спазмовъ, маточныхъ болей и въ началѣ ущемленія грыжи. Овсяная мука, смѣшанная съ коровьимъ масломъ, очищаетъ головные шолуди. Для отвара берутъ 3 унц. крупы на 4 ф. воды (2 бутылки).

Огурецъ. Огуречный сокъ можно пить 3 или 4 раза въ день по чайной чашкѣ, что очень полезно для сухотныхъ и страдающихъ чахоткою. Тотъ же сокъ и въ этихъ же случаяхъ, подслащенный, можно употреблять ежедневно по 2 столовыхъ ложки натошакъ и въ вечеру.

Ольха. Кора ольхи должна быть причислена къ противо-лихорадочнымъ средствамъ. По свидѣ-

тельству доктора Муррая, прикладывание ольховых листьев к сосцам женщин содействует усилению отделения молока.

Орляк, папортник женский, папортник водной, сказаняк. Порошек из корня этого растения изгоняет глисты всякаго рода. Взрослым дается от $\frac{1}{2}$ до 1 драхмы по утру и вечером, съ медомъ или бѣлымъ виномъ; дѣтямъ по 20 гранъ съ молокомъ, два раза въ день. Въ деревняхъ крѣпкій отваръ сего растения пьютъ отъ застарѣлаго кашля, простудной ломоты и примачиваютъ застарѣлыя язвы. Для дѣтей, одержимыхъ англійской болѣзнію, совѣтуютъ дѣлать подушки и покрывала изъ папортниковыхъ листовъ, примѣшивая къ нимъ огородныя пахучія травы.

Ортошникъ грецкій. Орѣхи изрѣдка употребляютъ и хвалятъ для изгнанія круглыхъ и даже плоскихъ глистовъ. Высушенные листья весьма полезны противъ золотухи, золотушныхъ страданій железъ, слизистыхъ оболочекъ кожи и противъ воспаленія глазъ. Употребляютъ ихъ въ видѣ отвара. Для истребленія глистовъ даютъ также густой отваръ зеленой орѣховой корки. При сухомъ воспаленіи глазъ полезно впускать въ нихъ посредствомъ мягкаго перышка по нѣскольکو капель орѣховаго масла, чрезъ что глаза предохраняются отъ пятенъ, бывающихъ нерѣдко послѣ оспы, кори и краснухи. Отваръ сухой зеленой корки рекомендуютъ въ застарѣлой венерической болѣзни. Для отвара берутъ 1 унц. зе-

ленной сухой корки на фунтъ воды и кипятятъ, пока останется 8 унц. жидкости. А также горсть свѣжихъ изрѣзанныхъ листовъ наливаютъ 8 унц. кипятка; принимаютъ по половинѣ чайной чашки. Кровоочистительный отваръ отъ застарѣлой венерической болѣзни готовится такъ: берутъ песочной осоки, можжевельоваго дерева, высушенной зеленой орѣховой кожуры по 4 унц. каждая и 1 унц. сюрмы (*antimonium crudum*). Этотъ сборъ отвариваютъ въ 20 фунт. воды. Пьютъ его при затвердѣніи железъ, опухоляхъ костей, въ грудныхъ припадкахъ и сухоткѣ, послѣдовавшей послѣ долговременнаго лѣченія и во всѣхъ застарѣлыхъ припадкахъ венерическаго свойства.

Осина, іудино дерево. Въ отварѣ почки осины, собираемая до развитія листовъ, употребляются въ простомъ и кровавомъ поносахъ и простудной ломотѣ въ членахъ. Корку ея также пьютъ отъ крестчавой боли и при задержаніи мочи; молодые толченые листья служатъ хорошею припаркою, утоляющею ломотныя и подагрическія боли. Сокомъ, извлекаемымъ изъ дерева, сгоняютъ лишай и бородавки. Почекъ и корки для отвара берутъ 1 унц. на фунтъ воды, кипятятъ до тѣхъ поръ, пока останется 8 унц. жидкости; процѣдивъ и подсластивъ, пьютъ этотъ отваръ по чайной чашкѣ 3 раза въ день. Почки настаиваются также и въ винномъ спиртѣ и больнымъ

даютъ отъ 20—30 40 капель съ тѣмъ же отваромъ при внутреннихъ нагноеніяхъ.

Осока песочная, немецкая сарсапарель. Растетъ по пескамъ около рѣкъ и проч. Употребляется при вторичномъ сифилисѣ, ревматизмѣ, золотухѣ, словомъ вездѣ, гдѣ сарсапарель и дѣйствуетъ, повидимому не слабѣе ея. Кромѣ того ее употребляютъ въ красныхъ нечистыхъ сыпяхъ и чирьяхъ, простудной ломотѣ и грудныхъ припадкахъ. Осоку многіе врачи рекомендуютъ противъ заваловъ внутренностей и глистовъ. Для внутренняго употребленія готовится отваръ изъ 2 унца свѣжаго изрѣзаннаго или сухого корня, который варятъ въ 2 ф. воды пока останется 1 фунтъ жидкости; процѣдивъ, пьютъ ее по чайной чашкѣ. Отваръ бываетъ гораздо дѣйствительнѣе, если его готовятъ вмѣстѣ съ пырейнымъ корнемъ, корнемъ сладкогорькаго и сосновыми верхушками.

Собирать корни песочной осоки надо весной, выбирая тѣ, которые болѣе углубляются въ землю.

Осокорь черная и тополь бѣлая. Изъ почекъ ихъ готовится мазь, которая служитъ превосходнымъ средствомъ для смягченія болящихъ почечуйныхъ шишекъ, трещинъ на грудяхъ или сосцахъ и отъ ожоговъ. Свѣже-выжатый сокъ изъ листьевъ осокори бѣлой или черной прикладываютъ къ зубамъ для утоленія боли. Почка черной осокори, употребляемая въ видѣ горячей

наливки, сильно гонятъ потъ. Винная настойка ихъ полезна въ цингѣ и грудной застарѣлой простудѣ.

Осокорь душистая, тагамаокъ, рай дерева. Смола извлекаемая изъ дерева посредствомъ надрѣзыванія коры или сама собою вытекающая изъ дерева, будучи намазана на холстину и приложена въ видѣ пластыря къ груди и животу уменьшаетъ рвоту и поносъ, происходящіе отъ слабости кишечнаго канала; этимъ же пластыремъ покрываютъ холодныя простудныя опухоли. Смола, растворенная въ винномъ спиртѣ, служитъ ранозѣлительнымъ средствомъ и укрошающимъ гнилость, а потому съ успѣхомъ прикладываютъ цинготнымъ и др. гнилымъ язвамъ, а также къ обнаженнымъ костямъ и ногтямъ. Настойку винную изъ душистой осокори, съ прибавленіемъ 1 грана сулемы прикладываютъ для излѣченія венерическихъ язвъ. Настойка безъ сулемы употребляется съ пользою въ астеническихъ лихорадкахъ, слабости нервной системы и недостаткѣ аппетита. Даютъ по $\frac{1}{2}$ —1 драхмъ (съ винограднымъ виномъ); 20—30 капель на сахарѣ, будучи принимаемы 2 или 3 раза въ день, укрошаютъ продолжительные поносы, происходящіе отъ слабости кишекъ, а также прекращаютъ теченіе женскихъ бѣлей и отдѣленіе гноевой мокроты у чахоточныхъ.

Осотъ, заячья капуста. Выжатый сокъ изъ всего растенія одобряется въ завалахъ брюшныхъ

внутренностей, желтухъ, грудномъ колотъѣ и воспаленіи груди, печени и кишекъ желчнаго свойства. Сокъ дается отъ 1—3 унц. съ сывороткою; или горсть свѣжей травы варятъ съ 1 ф. мясной похлебки.

II.

Павунъ, бобровица, вахта, стрѣла. Употребляется съ большою пользою въ блѣдной немочи и худосочіи, водяной болѣзни, ревматизмѣ, цингѣ, сведеніи и бездѣйствіи членовъ, при лишаяхъ, чесоткѣ, золотухѣ и при глистахъ. Для наливки 1 унц. сухой травы наливается 2 ф. горячей воды; прокипятивъ и процѣдивъ, даютъ больнымъ по чайной чашкѣ 3 раза въ день.

Папортникъ мужской, разрывъ-трава. Съ давнихъ поръ корнемъ его пользуются для изгнанія ленточной глисты, въ этомъ отношеніи папортниковъ корень вѣрнѣе другихъ средствъ и къ нему прибѣгать должно прежде всего. Принимаютъ корень въ порошокъ, отъ одной до 3 чайныхъ ложекъ, по нѣскольку разъ въ день съ водою, бульономъ и проч. Отваръ дѣйствуетъ менѣе вѣрно. Послѣ нѣсколькихъ пріемовъ хорошо давать слабительное. Вмѣстѣ съ тѣмъ полезно употреблять въ этихъ случаяхъ чеснокъ, сельди, ветчину и т. п. всего лучше за нѣсколько дней

до принятія корня держать умѣренную, голодную діету; запрещаютъ при этомъ, по возможности, мучную пищу, молоко и т. п. и назначаютъ между прочимъ горькія вещества, напр. полынь. Относительно времени употребленія корня нѣкоторые врачи соглашаются съ тѣмъ, что его лучше всего употреблять въ дни новолунія и ущерба луны. Корень долженъ быть свѣжъ и тщательно сохраняемъ; собирать его нужно подъ конецъ лѣта и осенью.

Новой воинскій, благовонный, ноготки. Это растеніе въ народной медицинѣ пользуется извѣстностью, какъ одно изъ лучшихъ средствъ противъ запора мѣсячныхъ кровей, маточныхъ спазмовъ и головной боли. Снаружи, въ видѣ припарки, ноготки разводятъ золотушныя опухоли, толченые листья и цвѣты уничтожаютъ бородавки, ножныя мозоли и язвы. Выжатый сокъ рекомендуется отъ зубной боли, происходящей отъ гнилости зубовъ. Для внутренняго употребленія на горсть цвѣтовъ наливаютъ унц. кипятку и, настоявъ, пьютъ вмѣсто чаю съ медомъ. Выжатый изъ всего растенія сокъ принимаютъ отъ 1 до 1½ унц., для изгнанія глистовъ.

Полынь. Употребляется при слабомъ пищевареніи и сродныхъ страданіяхъ, при гастралгіи, изжогѣ, кишечныхъ глистахъ (особенно для слабыхъ и лимфатическихъ лицъ и для послѣдова тельнаго лѣченія), даже въ перемежающейся лихорадкѣ. Для изгнанія круглыхъ глистовъ хва-

лять полынь и чеснокъ, по пучку того и друго-го; кладутъ ихъ на бутылку бѣлаго вина, процѣдивъ, употребляютъ эту настойку по утрамъ по сточовой ложкѣ.

Паскоть дикая, водяная конопля, конская грива. Ее употребляютъ въ слабости брюшныхъ органовъ, завалахъ внутренностей, особенно печени селезенки; запорѣ кровей, желтухѣ, кожныхъ болѣзняхъ, худосочи, отека ногъ, водяной шулятой грыжѣ и гнилыхъ цинготныхъ язвахъ; сокъ изъ ея листьевъ рекомендуютъ даже въ перемежающихся лихорадкахъ. Корень принимаютъ въ порошокъ отъ 5 до 10 гранъ. Для наливки щепоть травы кладутъ на 4 унц. горячей воды или на горсть травы берутъ 12 унц. сыворотки, которую вскипятивъ, даютъ по 2 столовыхъ ложки черезъ каждые 2 часа. Свѣжая толченая трава очищаетъ цинготныя раны и другія язвы и заживляетъ ихъ.

Р.

Ревень. Растетъ въ Восточной Сибири и киргизскихъ степяхъ. Корень ревеня въ малыхъ приемахъ употребляется какъ крѣпительное при разстройствѣ пищеваренія, образованія кислоты, судорогахъ желудка, кардиалгii и т. п. Далѣе его употребляютъ какъ легкое слабительное,

всегда, когда слѣдуетъ вѣрно очистить кишки, при истерикѣ, ипохондрii, круглыхъ глистахъ и пр. Ревень употребляютъ также при поносѣ, происшедшемъ вслѣдствіе острораздражающей пищи и питья, съ цѣлю скорѣе достигнуть испражнения вредныхъ веществъ. Какъ крѣпительное средство ревеня даютъ въ плотномъ видѣ, въ видѣ порошка или пилюль въ размѣрѣ 3—6 гранъ на приемъ, по нѣскольку разъ въ день. Для проноснаго ревеня обыкновенно даютъ съ другими веществами. Изъ препаратовъ, ревеня заслуживаютъ вниманія: 1) ревенная вытяжка (*extratum rhei*), — дается въ двойныхъ приемахъ; 2) сложная ревенная вытяжка (*extract rhei compositum*). Даютъ отъ 10 до 20 гр. по большей части въ видѣ пилюль; 3) водяная ревенная настойка (*Tintura rhei arnosa*); 4) винная ревенная настойка (*Tinctura rhei vinosa*); принимаютъ по 20—30 капель, въ случаяхъ рѣзи въ животѣ, судорогахъ его и т. д.

Рѣжуха, жеруха, кресь водяной. Употребляется въ цингѣ, упорномъ кашлѣ, гнойной чахоткѣ, сонливой лихорадкѣ и каменной болѣзни. Выжатаго соку, принимаютъ по 2 унц. съ сывороткою или кисловатыми минеральными водами, напр., сельтерскою.

Рѣпникъ обыкновенный. Растетъ по окраинамъ лѣсовъ и дорогъ. Отваръ ея съ большою пользою употребляется какъ полосканье въ горловыхъ болѣзняхъ.

С.

Сальникъ, жидкость. По своему смягчительному дѣйствию, корень сальника, принимаемый въ видѣ наливки, сиропа или экстракта оказываетъ весьма значительную пользу въ кровохарканіи.

Свиной хвостъ, хвоя трава, желтоленъ. Корень его употребляется противъ мокротнаго кашля, головной боли, въ грудныхъ простудныхъ припадкахъ, запорѣ мѣсячныхъ кровей, зубной боли и гнилыхъ язвъ. Отваръ корня употребляется въ видѣ полосканья и примочки. Онъ готовится изъ фунта воды и 1 унціи корня.

Сердечникъ, сердечная трава, львиноустъ сердечный, лусиная лапа, львиный хвостъ, дикая крапива. Въ видѣ наливки это растеніе употребляется въ истерикѣ, біеніи сердца, запорѣ, мѣсячныхъ и родовыхъ кровей, теченіи бѣлей, слабости нервовъ, отъ глистовъ, въ простудныхъ лихорадкахъ. Для внутренняго употребленія полунціи травы наливается 8 унц. воды, которую вскипятить и процѣдивъ, принимаютъ по 2 столовыхъ ложки чрезъ каждые 2 часа.

Сіумъ водяной. Корнямъ его приписываютъ силу исцѣлять катарръ легкихъ, кровохарканіе и теченіе крови изъ мочевыхъ органовъ.

Сіумъ широколистный и узколистный имѣетъ тѣ же свойства.

Сладкогорькое, сорочья ягода. Это растеніе хвалятъ, по его потогоннымъ и мочегоннымъ свойствамъ, противъ золотушныхъ, ревматическихъ, сифилитическихъ страданій, а также противъ хроническихъ болѣзней кожи. По его дѣйствию на слизистыя оболочки противъ катарра, даже противъ легочной чахотки, коклюша, чтобы способствовать къ выхаркиванію. Даютъ его въ отварѣ, въ произвольномъ количествѣ.

Смородина черная. Листья и побѣги ея дѣйствуютъ укрѣпляющимъ образомъ на желудокъ, они между прочимъ входятъ въ составъ противозолотушнаго набора, составляемаго изъ равныхъ частей: цвѣтовъ аютиныхъ глазокъ, череды, калинныхъ побѣговъ и листьевъ черной смородины.

Изъ ягодъ *красной смородины* готовятъ охлаждающіе морсы и сиропы.

Собачья мята, чернокудренникъ волосистый. Трава этого растенія употребляется, хотя довольно рѣдко, противъ водянки, ломоты и ревматизма, въ отварѣ, по унціи и болѣе въ день.

Сокольникъ волосатый, ноготная трава, мышь и ушки и особенно другой видъ *сокольникъ зонточный* почитается весьма хорошимъ средствомъ противъ кашля и легочной чахотки, при кото-

Лѣчебникъ-травникъ.

рыхъ употребляютъ водяную наливку сокольника по 2 столовыхъ ложки 4 раза въ день.

Соколий перелетъ, крестовая стародубка. Прежде хвалили это растеніе противъ перемежающейся лихорадки и укушенія бѣшеною собакой.

Солодка жесткая, колючая. Употребляютъ преимущественно при кашлѣ, воспаленіи дыхательныхъ вѣтвей. Даютъ солодковый корень въ видѣ порошка произвольными приемами, или въ видѣ наливки.

Спорынья. Она давно уже почитается за средство, которымъ можно дѣйствовать на двигательные нервы и мышечное существо беременной матки; спорынью пользуютя, когда желаютъ усилить сокращеніе матки, — потуги. Но если роды замедляются обстоятельствами, которыхъ не можетъ преодолѣвать простое усиленіе потуговъ безъ опасности, въ этомъ случаѣ спорынья бесполезна и даже вредна. Кромѣ того спорынья не всегда безопасна для очень раздражительныхъ, а также для сильныхъ и полнокровныхъ женщинъ и особенно для рождающихъ въ первый разъ.

Спорыню употребляютъ также при упорномъ кровотеченіи изъ носу, кровавомъ кашлѣ, кровавой рвотѣ и кровавомъ мочеиспражненіи. Спорынья всего лучше дѣйствуетъ въ порошокѣ. Чтобы произвести скоро и вѣрно потуги, вообще дѣйствіе на матку, даютъ на приемъ по 10—

10 гранъ, смотря по обстоятельствамъ, каждые $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ часа или рѣже, до появленія потуговъ.

Т.

Табакъ. Употребляется только снаружи. Наливка его или самыя листья, вареные съ водою помогаютъ при вщемленныхъ грыжахъ, повздошной коликѣ; упорномъ поносѣ, воспаленіи кишекъ, утомленіи, въ этихъ случаяхъ наливку употребляютъ въ формѣ клистировъ, примочекъ, припарокъ, умываній, при чемъ всегда должно помнить, что употребляемый даже въ такомъ видѣ, табакъ можетъ произвести отравленіе, въ силу заключающагося въ немъ сильнѣйшаго яда — никотина.

Тыква горькая, чертовы яблоки. Употребляются въ брюшныхъ завалахъ, водяной болѣзни, запорѣ мѣсячныхъ кровей, блѣдной немочи, падучей болѣзни, умопомѣшательствѣ и бездѣйствіи членовъ послѣ паралича. Въ порошокѣ принимаютъ отъ 1 до 5 гранъ съ вишневымъ клеємъ, или растерши съ яичнымъ желткомъ. Для клистира полагается 1 или 2 драхмы на фунтъ жидкости. Такой клистиръ полезенъ тамъ, гдѣ требуется сильнѣйшее возбужденіе, какъ-то: при апоплексическомъ ударѣ, параличѣ, ущемленной грыжѣ и проч.

Ф.

Фиалка душистая. Цвѣты въ наливкѣ дѣйствуютъ, какъ грудное средство; пьютъ, какъ чай.

Фиалка собачья. Дѣйствіе ея корня рвотное, — и онъ при нуждѣ можетъ замѣнить ипекакуану.

Х.

Хмѣль. Шишки хмѣля употребляются, какъ средство противъ золотухи и хроническихъ болѣзней кожи. Принимаютъ ихъ въ этихъ случаяхъ въ формѣ водяной наливки.

Христофорова трава, воронецъ. Дѣйствіе этой травы сходно съ волчьимъ корнемъ. См. эту траву.

Хрѣнь. Корень его употребляютъ въ скорбутѣ въ видѣ водяной, винной или пивной наливки.

Ц.

Цинготная трава, варуха, морской салатъ, ложечная трава. Она есть хорошее средство отъ скорбута, кромѣ того она полезна въ мокротной одышкѣ и водяной болѣзни, въ худосочіи и кожныхъ болѣзняхъ, которыя явились послѣдствіемъ цинготной порчи соковъ. Снаружи, свѣжая толченая трава прикладывается съ пользою къ цинготнымъ и другимъ гнилымъ язвамъ. Выжатый сокъ ея, смѣшанный съ небольшимъ количествомъ квасцовъ, служитъ хорошимъ средствомъ отъ цинготной порчи десенъ и язвъ во рту. Причемъ его употребляютъ въ видѣ полосканья. Для цинготныхъ дѣлается наливка изъ горсти травы и 12 унц. кипяченой сыворотки, которую выжавъ и процѣдивъ, даютъ пить по чайной чашкѣ 2 или 3 раза въ день. Или же выжатый сокъ дается по 1, 2 и 3 унц. сывороткою.

Ч.

Чемерица черная. Отъ большихъ приемовъ (30—40 гранъ) можетъ послѣдовать смерть со всѣми признаками отравленія. Поэтому употребленіе ея безъ совѣта врача не должно быть допускаемо. Полезна же можетъ быть чемерица въ помѣшательствѣ, меланхоліи, эпилепсіи и другихъ нервныхъ страданіяхъ. По ея дѣйствию на кишечный каналъ и отдѣленіе мочи, ее даютъ противъ водянки, а также для изгнанія глистовъ и при упорномъ запорѣ. Кромѣ того черная чемерица можетъ быть полезнаю и противъ хроническихъ болѣзней кожи, въ видѣ наружнаго средства.

Чернобыльникъ. Въ народѣ онъ уже давно употребляется противъ эпилепсіи, пляски св. Витта, лунатизма, въ истерическихъ и сродныхъ страданіяхъ, особенно женскаго пола и дѣтей. Корень его всего лучше въ порошокъ давать чайными ложками съ сахаромъ, хининомъ и запивать пивомъ. Нѣкоторые народные лѣкаря, высушивъ въ тѣни корень чернобыльника, выжимаютъ изъ него сокъ, даваемый ими противъ падучей болѣзни. Объ этомъ средствѣ отзываются съ большею похвалою.

Чешуйчатый корень, петровъ крестъ. Этому растенію народъ приписываетъ способность доставлять плодородіе бесплоднымъ женщинамъ. Съ этою цѣлю поселянки нѣкоторыхъ мѣстностей собираютъ его на восходѣ солнца и отваривъ все растеніе, пьютъ этотъ отваръ ежедневно по чайной чашкѣ; другіе кипятятъ его съ пивомъ и пьютъ такимъ же образомъ.

Колдунья. Этому виду приписываютъ свойства петрова креста.

Ш.

Шалфей. Его употребляютъ въ слизистыхъ лихорадкахъ, молочницѣ у новорожденныхъ и водяной болѣзни. Принимаютъ его въ видѣ наливки, дистиллированной изъ него воды, спиртной настойки и масла.

Шафранъ. Употребляется какъ успокоительное средство противъ нервныхъ страданій всякаго рода, особенно у дѣтей и женщинъ,—при судорогахъ, истерикѣ; также при недостаточномъ отдѣленіи мѣсячныхъ кровей, при неправильномъ пищевареніи и судорогахъ желудка. Даютъ его въ пилюляхъ и порошокъ по 10—30 гранъ и больше на приемъ; а также въ видѣ наливки,

Шиковникъ кирказонъ или кокорникъ, смольникъ.
Поселяне приволжскихъ губерній употребляютъ отваръ кирказона отъ всякаго лому и боли въ костяхъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

А.

Армудъ, квітъ, уни, айва, пшва. Свѣжіе плоды полезно употреблять въ желчногцилыхъ болѣзняхъ и цингѣ; сѣмяна налитыя кипяткомъ, даютъ большое количество слизи; ее прикладываютъ къ ожогамъ, трещинамъ на сосцахъ, къ глазамъ, при сухомъ ихъ воспаленіи, въ молочницѣ и гортанной боли, вмѣсто полосканья. Выжатый сокъ изъ плодовъ дается по столовой ложкѣ; печеные плоды слабятъ, поэтому ихъ съ пользою можно давать больнымъ, одержимымъ запоромъ.

Аистникъ вонючій. Наливку аистника съ горячею водою полезно пить въ кровавомъ мочетеченіи, поносахъ, боляхъ въ животѣ, почкахъ и поясницѣ. Снаружи свѣжая толченая трава его прикладывается для разведенія грудницы, раковыхъ затвердѣній и заживленія язвъ на сосцахъ и дѣтородныхъ частяхъ. Въ деревняхъ свѣжую толченую траву аистника прикладываютъ къ

грудямъ для разогнанія молока, послѣ отнятія ребенка. Свѣже-выжатымъ сокомъ, смѣшаннымъ съ медомъ излѣчиваютъ злокачественныя язвы.

Алебастренникъ стѣпной. Свѣжую траву крестьяне нѣкоторыхъ мѣстностей пьютъ какъ чай противъ грудныхъ болѣзней и кашля.

Ампрыкъ, толокнянка медвѣжья, медвѣжій виноградъ, медвѣжья ягода толокнянка стелющаяся. Съ небольшою пользою это растеніе можетъ быть употребляемо во всѣхъ хроническихъ страданіяхъ мочевыхъ органовъ, хроническомъ воспаленіи почекъ, геморрояхъ, кровотеченіи, недержаніи мочи, параличѣ мочевого пузыря и даже при каменной болѣзни, чтобы растворить песчинки или камни. Даютъ ампрыкъ въ отварѣ или въ видѣ порошка отъ 10 до 20 гранъ.

Б.

Базилникъ. Въ наливкѣ употребляется для укрощенія рвоты, въ слабости желудка, ревматизмѣ и запорѣ мѣсячныхъ кровей отъ простуды. Наливку составляютъ изъ 1 или 2 драхмъ травы и 4 унц. горячей воды; ее пьютъ вмѣсто чаю. При внюхиваніи истертой въ порошокъ травы уничтожается долговременный насморкъ. *Балданъ, крушина, собачья ягода.* Внутренняя корка употребляется какъ слабительное средство; въ боль-

шихъ приемахъ производитъ даже рвоту. Въ отварѣ ее также съ успѣхомъ употребляютъ противъ водяной болѣзни, мокротнаго кашля, удушья, желтухи, глистовъ и чесотки; а растертая съ вишневымъ клеємъ принимается въ видѣ пилюль, помогаетъ противъ 5 дневныхъ лихорадокъ и тесемочной глисты. Ее даютъ въ порошокъ отъ $\frac{1}{2}$ до 1 драхмы. Для отвара 2 или 3 драхмы корки кладутъ на 8 унц. Противъ чесотки ее употребляютъ въ видѣ мази, составленной изъ порошка средней корки и свиного сала. Какъ слабительное въ деревняхъ принимаютъ порошокъ средней корки отъ 1 до 2 золотниковъ.

Барбарисъ. Ягоды его полезны въ воспалительныхъ, желчныхъ гнилыхъ лихорадкахъ: желтыхъ горячкахъ, сопровождаемыхъ гнилымъ поносомъ. Коркою барбариса пользуютъ въ желтухѣ и при теченіи бѣлей, при чемъ ее употребляютъ или въ видѣ водяной наливки или въ видѣ винной настойки.

Бедренецъ каменистый. Употребляется въ жабѣ, запорѣ кровей, истерикѣ, маточныхъ припадкахъ и припадкахъ бывающихъ послѣ продолжительнаго ртутнаго лѣченія. Дается въ порошокъ приемами до 20 гр., чаще же въ видѣ водяной наливки (2 драхмы корня на 8 унц. кипяченой воды): эта же наливка служитъ и полосканьемъ.

Бирючина. Отваръ листьевъ ее крестьяне пьютъ противъ лихорадки и, кажется, не безъ пользы.

Болдырьянъ дикій, маунъ земляной ладанъ, очной корень. Болдырьянъ, повидимому, всего полезнѣе при расстройствахъ нервной системы, особенно для женскаго пола, для истерическихъ и хлоротическихъ лицъ. Такимъ образомъ болдырьянъ или, что то же валеріану, даютъ противъ истерическихъ судорогъ боли, тоски, ипохондріи у мужчинъ. Менѣе полезна валеріана противъ эпилепсіи, пляски св. Витта, коклюша, одышки, судорогъ желудка, паралича тифа, оказывая лишь кратковременную палліативную пользу изъ валерьяны готовятъ въ аптекахъ: валерьянное масло, валерьянную настойку экстрактъ валеріаны и проч.

Бѣшеница водяная, мутникъ, омегъ. Растеніе это растетъ въ канавахъ, ручьяхъ и болотахъ. Оно чрезвычайно ядовито. Многіе врачи приписываютъ бѣшеницѣ могущественныя цѣлебныя силы и рассказываютъ почти о невѣроятныхъ случаяхъ исцѣленія его. Но другіе наоборотъ заслуживающіе полного довѣрія, признаютъ, что употребленіе этого растенія внутрь можетъ скорѣе принести вредъ чѣмъ пользу. Снаружи свѣжіе толченые листья и въ припаркахъ прикладываютъ къ твердымъ паховикамъ, золотушнымъ опухолямъ железъ, къ зубу и раковымъ язвамъ, потому что бѣшеница въ такомъ видѣ разбиваетъ всякаго рода затвердѣлыя опухоли и утоляетъ боль.

В.

Вербейникъ. Въ видѣ чая или наливки употребляется въ кровохарканіи, кровавомъ поносѣ, сильномъ теченіи мѣсячныхъ кровей, долговременномъ столовомъ теченіи и въ женскихъ бѣляхъ, въ глазныхъ ранахъ и ушибахъ. Снаружи толченая трава прикладывается для прекращенія носоваго кровотеченія и къ ранамъ, при поврежденіи небольшихъ кровеносныхъ сосудовъ. Для этой цѣли служить еще лучше выжатый сокъ изъ свѣжей травы. Въ порошокъ вербейникъ дается по драхмѣ и болѣе; для наливки полагается 1 унц. травы на фунтъ горячей воды, которую, вскипятивъ разъ, должно процѣдить чрезъ $\frac{1}{2}$ часа и принимать холодную по половинѣ чайной чашки каждыя 2 или 3 часа. Снаружи употребляется въ видѣ промывательнаго и для спринцованія. Свѣже выжатый сокъ, въ приемахъ внутрь по ложкѣ, полезенъ въ астеническихъ кровотеченияхъ, простыхъ и кровавыхъ поносахъ.

Вербейникъ полушечный, полушечная трава, луговой чай, денежникъ.—по свойствамъ и дѣйствию сходенъ съ предъидущей породой.

Верескъ обыкновенный. Ученая медицина вычеркиваетъ это растеніе изъ списка одаренныхъ цѣлебною силою; но народъ видитъ въ немъ одно изъ вѣрнѣйшихъ средствъ противъ каменной бо-

лѣзни. Съ этою цѣлю во многихъ изъ нашихъ губерній поселяне пьютъ отваръ его, какъ чай. Приносить ли въ этомъ случаѣ верескъ какую либо пользу, сказать нельзя, за недостаткомъ опытовъ.

Верескъ восковой, ягодный, пахучка сухоягодная. Его пьютъ противъ разныхъ болѣзней въ формѣ чая, но по его одуряющему дѣйствию онъ скорѣе можетъ принести вредъ, почему и нельзя его рекомендовать для употребленія внутрь.

Волконогъ, водяная шандра, волчья лапа. Имъ пользуются одержимыхъ перемежающейся лихорадкой. Даютъ въ видѣ порошка, водяной и спиртной наливкѣ.

Воловикъ аптечный, воловій языкъ, цареградскій красный корень. Растетъ по необработаннымъ каменистымъ мѣстамъ. Это растеніе съ пользою можетъ быть употребляемо въ удушьи и во всѣхъ грудныхъ мокротныхъ болѣзняхъ. Выжатый изъ него сокъ благотворно дѣйствуетъ при воспаленіи мочевыхъ путей. Для отвара на 8 унц. воды кладется $\frac{1}{2}$ унц. корня; для наливки на 12 унц. горячей воды берется по горсти его цвѣтовъ и травы. Эта послѣдняя употребляется обыкновенно какъ чай. Сокъ употребляютъ въ размѣрѣ 3 - 4 унц. въ день.

Воробейникъ аптечный. Сѣменамъ этого растенія приписываютъ силу разбивать каменную болѣзнь, въ которой народные лѣкаря даютъ принимать порошокъ сѣмянъ воробейника ежедневно

по чайной ложкѣ или щепоткѣ на стаканъ воды. Листья его пьютъ въ видѣ отвара, какъ мочегонное.

Вьюнокъ забурный, повилочный колокольчикъ, обвивальня заборная. Свойства вьюнка слабительныя, порошокъ вьюнковаго корня, какъ слабительное слѣдуетъ принимать до 15 до 24 гранъ.

Вѣтряница лѣсная, лѣсной одомъсячникъ Употребляется, въ силу ядовитыхъ ея свойствъ только какъ наружное средство; такъ свѣжіе толченые листья въ весеннихъ лихорадкахъ во время знобленія прикладываются къ плечу или къ пястью руки; въ шолудяхъ и мигрени ихъ совѣтуютъ прикладывать къ страждущей части, въ спинной ломотной боли они кладутся между плечъ; въ бедренной и членовной ломотахъ — къ страждущимъ частямъ — вмѣсто шпанскихъ мушекъ. Однако долго не слѣдуетъ держать на тѣлѣ листья вѣтряницы, такъ какъ натянутые ею пузыри весьма долго не заживаютъ и не рѣдко превращаются въ язвы; оставлять листья на тѣлѣ нужно только до тѣхъ поръ, пока кожа покраснѣетъ и нѣсколько возвысится.

Вѣтряница печеночная, завитки, трилистникъ чистый. Траву съ цвѣтами пьютъ вмѣсто чаю, полагая 1 унц. на фунтъ горячей воды отъ внутреннихъ заваловъ, желтяницы, капельнаго мочетеченія; теченія изъ мочеваго пузыря, въ кровохарканіи и поносахъ. Снаружи:—въ видѣ полос-

канія въ гортанной жабѣ, промыванія и примачиванія старыхъ смрадныхъ язвъ.

Вьюряница прострельная, сонъ трава. Употребляется въ начинающейся слѣпотѣ, или глазномъ подтекѣ, пятнахъ, роговидной оболочкѣ и другихъ болѣзняхъ; одобряется также въ бездѣйствіи членовъ или параличѣ и въ венерическихъ припадкахъ, на примѣръ ночныхъ членовъ составныхъ боляхъ, опухоляхъ костей, нечистыхъ язвахъ, затверденіи ядеръ, шишкахъ около прохода и въ костоѣдѣ. Для наливки берутъ сухой травы съ цвѣтами отъ 1 до 3 драхмъ на 12 унцій горячей воды, которую чрезъ четверть часа, послѣ того какъ она отстоится въ закрытомъ сосудѣ, слѣдуетъ процѣдить и принимать ежедневно 3 раза отъ 2 до 4 унц. Снаружи употребляется въ видѣ примочки.

Г.

Горчанка желтая. Употребляется всего чаще при разстройствѣ пищеваренія, независащемъ отъ воспалительныхъ или вообще значительныхъ болѣзней желудочныхъ оболочекъ, также при золотухѣ, англійской болѣзни и ломотѣ слабыхъ изнуренныхъ лицъ. Лучше всего давать ее въ видѣ настойки 1—2 въ день, или въ видѣ отвара, въ такомъ же количествѣ.

Гравилатъ береговой. Употребляется въ слабости желудка, продолжительныхъ поносахъ, маточныхъ и геморроидальныхъ кровотеченияхъ и весеннихъ перемежающихся лихорадкахъ. Корень въ порошокъ дается отъ 2 скрупуль до 1 драхмы; снаружи имъ присыпаются венерическія язвы; для отвара $\frac{1}{2}$ унц. корня кладутъ на фунтъ воды.

Грушовка кружололистая, дикая грушица. Употребляется въ поносахъ, кровотеченияхъ и слишкомъ гнойныхъ язвахъ. Для внутренняго употребленія: двѣ щепоти сухой травы наливается 8 унц. горячей воды; эту наливку пьютъ вмѣсто чаю. Крѣпкій отваръ служитъ полосканьемъ, примочкою и омываніемъ для гнилыхъ ранъ: свѣжая толченая трава прикладывается на гнилыя раны. Въ порошокъ дается по 6 гранъ, тотъ же порошокъ употребляется въ видѣ присыпки.

Д.

Десятильтникъ дикій, десятильтникъ пижма. Въ Лапландіи женщины, по свидѣтельству Линнея, парятъ пижмою для сообщенія половымъ органомъ большей растяжимости и для облегченія чрезъ это родовъ. Кромѣ того пижма въ народѣ употребляется какъ противоглистное сред-

ство (преимущественно цвѣты, рѣже сѣмена), и, повидимому, изгоняетъ глистовъ довольно вѣрно. Пользовались ею также при разстройствѣ пищеваренія, даже при блѣдной немочи, перемежающейся лихорадкѣ и водянкѣ. Даютъ пижму въ порошокъ, въ видѣ каши, наливки и вообще какъ цытварное сѣмя.

Дубровка трилистная, кадило, паклузъ, параличная трава. Парижскіе врачи съ успѣхомъ употребляли это растеніе противъ простуднаго ревматизма и членовыхъ болей. Для наливки 2 или 3 драхмы травы кладутъ на фунтъ горячей воды; снаружи она употребляется въ видѣ припарки.

Дубовка, майоранъ лошадиный, конскій чеснокъ. Ее хвалятъ противъ слабости желудка, въ гнилыхъ злокачественныхъ горячкахъ, брюшныхъ завалахъ, водяной болѣзни и отъ глистовъ, а также противъ ревматизма и другихъ простудныхъ ломотъ; нечистыхъ и гнилыхъ язвъ, багровыхъ ушибовъ и антонова огня. Для наливки 1 или 2 щепоти травы кладутъ на 6 унц. кипячей воды или вина, принимаютъ ее по 2 или по 3 унц. каждые 2 часа. Употребляемая внутрь вмѣсто чая и въ видѣ припарки приноситъ пользу въ ломотныхъ болѣзняхъ. Порошкомъ сухой травы съ успѣхомъ присыпаются гнилыя язвы. Винную настойку свѣжаго и сухаго растенія даютъ въ случаяхъ укушенія бѣшенымъ или ядо-

витымъ животнымъ. Для этой настойки 2 горсти цвѣтущей травы кладутъ на бутылку вина.

Дубовыя яюдки, омела, птичій клей. Растетъ, какъ чужеедно растеніе, на дубахъ, грушахъ, яблоняхъ и липахъ. Это растеніе оказываетъ полезное дѣйствіе въ судорожныхъ болѣзняхъ и спазмахъ, какъ то корчахъ св. Витта, судорожномъ удушьи, истерикѣ, расслабленіи членовъ, кровавомъ поносѣ. Въ порошокъ омелу даютъ отъ $\frac{1}{2}$ до 1 драхмы; въ отварѣ по 2 столовыхъ ложки чрезъ 2 часа. Омелу должно собирать по возможности съ дубовъ, срѣзывать ее нужно въ декабрѣ и, высушивъ, хранить въ стеклянной закупоренной банкѣ.

3.

Завалецъ, норычникъ, собачья голова, красный корень, зобный корень, сторовина. Его рекомендуютъ въ зобѣ, золотухѣ, воспалительной жабѣ въ горлѣ, чесоткѣ и другихъ кожныхъ болѣзняхъ. Снаружи листьями норычника прикладываются разныя твердыя и болящія опухоли: порошкомъ корня присыпаютъ язвы для очищенія и заживленія. Выжатый изъ растенія сокъ съ коровьимъ масломъ составляетъ мазь отъ чесотки. Сухой корень внутрь даютъ въ порошокъ по 1 драхмѣ, или въ видѣ отвара, для пригото-

нія котораго на $\frac{1}{2}$ унціи корня кладуть 8 унц. воды и кипятятъ, пока останется $\frac{1}{2}$ фунта жидкости; подсластивъ, дають его по небольшой чайной чашкѣ. Снаружи этотъ отваръ служитъ полосканьемъ и омываньемъ.

Змѣголовникъ молдавскій, турецкая мелисса. Его употребляютъ при худосочи, желудочныхъ спазмахъ, біеніи сердца, головной боли, боляхъ послѣ родовъ и въ простудной ломотѣ. Снаружи свѣжую толченую траву змѣголовника прикладываютъ для заживленія ранъ. Выжатый сокъ, смѣшанный съ простымъ виномъ служитъ хорошею ранозѣлительною примочкою. Въ видѣ каплазмы съ мукою излѣчиваетъ ногтеѣду. Для наливки на горсть травы берутъ 1 унц. кипячей воды; подсластивъ, пьютъ вмѣсто чаю. Винная настойка гораздо дѣйствительнѣе, ее можно принимать по 1 и по 2 столовыхъ ложки нѣсколько разъ въ день. Снаружи ее употребляютъ въ видѣ припарки и примочки.

Золотыиышникъ, золотникова трава. Всѣ части этого растенія имѣють цѣлебныя свойства, подобныя желтой *горечаекѣ* (см. эту траву) и употребляется она въ такихъ же формахъ.

К.

Калуберъ. Употребленіе водки, настоянной его листьями, полезно при разстройствѣ пищеваренія.

Камфарница. Растетъ между Волгою и Ураломъ и въ Сибири. Его совѣтуютъ весьма многіе врачи употреблять въ слабости нервовъ, истерикѣ, судорожномъ удушьи, коклюшѣ, простудной ломотѣ, долговременномъ насморкѣ, запорѣ мѣсячныхъ кровей, а также въ первомъ періодѣ водяной болѣзни. Для внутренняго употребленія готовится наливка изъ 1 драхмы листьевъ и 4 унц. горячей воды. Въ Сибири съ успѣхомъ пользуются этимъ растеніемъ для извлеченія грудной и чревной водяницы для чего камфарницу употребляютъ въ отварѣ и въ порошокъ отъ $\frac{1}{2}$ до 1 золотника.

Кервель. Употребляются въ лихорадкахъ, водяной болѣзни, кровяныхъ маточныхъ застояхъ, особенно послѣ родовъ. Кервельная похлебка замѣняетъ всѣ другія лѣкарства въ застарѣломъ кашлѣ, удушьи, кровохарканіи, чахоткѣ. Въ продолжительномъ грудномъ колотьи, сильномъ скопленіи мокротъ, желтухѣ и гемморoidalныхъ завалахъ совѣтуютъ выжатый изъ кервеля сокъ пить съ молочной сывороткою. Средство это полезно также въ изнурительной или сухотной ли-

хорадкѣ, золотушныхъ затверденіяхъ железъ, въ долговременныхъ кожныхъ болѣзняхъ, какъ-то: въ чесоткѣ, лишаяхъ и проч. Свѣжую траву кервеля даютъ больнымъ въ супахъ. Для наливки на 2 горсти травы берется фунтъ горячей сыворотки, которую, настоявъ и прожавъ сквозь полотене, пьютъ по чайной чашкѣ нѣсколько разъ въ день. Выжатый сокъ принимаютъ также съ сывороткою по 2 унц. утромъ и вечеромъ.

Козелецъ дикій, уховникъ, косматикъ. Крѣпкій водяной отваръ одобряютъ для разведенія густыхъ мокротъ, брюшныхъ заваловъ, въ мокротномъ удушьи, ипохондріи и подагрѣ. Въ послѣднемъ случаѣ выжатый сокъ дѣйствительнѣе отвара. Для отвара, 1 унцію корня кладутъ на 1 фунтъ воды, которую кипятятъ пока останется 8 унц. Выжатый сокъ даютъ по 1 или по 2 унціи съ сывороткою.

Козлобородникъ, чертова борода. Отваръ корня этого растенія одобряютъ въ кашлѣ, мочерѣзѣ, припадкахъ каменной болѣзни, кожныхъ сыпяхъ, свербежѣ всего тѣла и золотухѣ. Снаружи со свѣтують толченую траву прикладывать на цынготныя и другія раны, которыя она заживляетъ; въ видѣ припарки она умягчаетъ затвердѣлыя опухоли.

Коперъ. Полезенъ при разстройствѣ пищеваренія, вѣтряной коликѣ и боли живота, отъ запора кровей, а также во всѣхъ маточныхъ астеническихъ болѣзняхъ и падучей болѣзни. Въ порошокѣ

сѣмена копера даютъ приемами по 1 драхмѣ. Для наливки на 6 унц. горячей воды кладутъ 2 драхмы корня, а для промывательнаго на тоже количество воды 3 драхмы его.

Кошечья трава, кошечья мята. Употребляется въ маточныхъ болѣзняхъ, блѣдной немочи, запорѣ кровей, истерикѣ, судорожномъ кашлѣ, одышкѣ, брюшныхъ завалахъ и въ желтухѣ. Снаружи въ тѣхъ же болѣзняхъ полезна она въ видѣ припарокъ и ваннъ. Наливку готовятъ изъ 1 драхмы или цвѣтныхъ верхушекъ и 4 унц. бѣлаго вина. Въ порошокѣ траву съ цвѣтными верхушками даютъ по 20 гранъ, 2 или 3 раза въ день; свѣже выжатого сока даютъ по 2 унц. Для клистировъ кладутъ унцію травы на фунтъ жидкости.

Кресъ луговой, полевой сердечникъ, полевая горчица, смолянка. Употребляется въ судоргахъ, судорожныхъ корчахъ, истерикѣ, одышкѣ и противъ глистовъ. Выжатый сокъ рекомендуется въ цингѣ, завалахъ внутренностей, желтухѣ и водяной болѣзни. Молодую траву, съ уксусомъ, солью и масломъ, употребляютъ вмѣсто салата; въ порошокѣ даютъ цвѣтныя верхушки утромъ и вечеромъ отъ 20 гр. до $\frac{1}{2}$ драхмы. Выжатый сокъ принимаютъ по столовой ложкѣ нѣсколько разъ въ день съ сывороткою.

Крестовникъ дикій, старина. Его рекомендуютъ какъ средство противъ глистовъ, особенно круглыхъ, желтухи, простуды, кровохарканія, моче-

рѣза и теченія женскихъ бѣлей. Снаружи, въ видѣ припарки, употребляется при грудницѣ отъ сгущенія молока. Внутрь даютъ выжатый сокъ по 1 или по 2 унц. для промывательнаго горсть травы кладутъ на фунтъ воды.

Кринъ, лилія бѣлая. Говорятъ, что лепешки, испеченныя изъ сока лилейныхъ луковицъ, смѣшаннаго съ яичною мукою, излѣчиваютъ водяную болѣзнь. Для этой же цѣли можно, испекши лилейныя луковицы въ горячей золѣ, на 2 унц. ихъ мякоти налить 9 унц. бѣлаго вина и принимать по столовой ложкѣ.

М.

Мандрагоръ мужской корень, Адамова голова, сонное зелье. Свойства его корня ядовитыя, поэтому внутрь онъ дается въ малыхъ приемахъ. Корень мандрагора употребляютъ для утоленія болей и доставленія сна, особенно въ судорожныхъ припадкахъ, истерикѣ, ломотѣ и меланхоліи. Снаружи этотъ корень, истолокши и смѣшавъ съ медомъ, прикладываютъ въ видѣ катаплазмы для разведенія скуловыхъ опухолей, шейныхъ золотушныхъ затвердѣній, тугихъ паховиковъ и венерической окрѣплости ядеръ. Внутрь корень мандрагора употребляютъ въ наливкѣ и порошокѣ. Наливка готовится изъ 20 гр. сухаго и тол-

ченаго корня и 10 унц. кипячей воды; ее даютъ по столовой ложкѣ нѣсколько разъ въ день. Принятый въ порошокъ въ размѣрѣ 2—3 гр производитъ усыпленіе. Для укрощенія жестокой ломоты и подагрической боли порошокъ корня даютъ отъ 1—4 гранъ, смѣшавъ съ медомъ.

Маргаритка, бѣлая скороспѣлка, бѣльцы, стоцветъ. Нѣкоторые медики, а равно и народные лѣкаря употребляютъ траву ея въ чаоткѣ, брюшныхъ завалахъ и запорахъ мочи. Кромѣ того со-вѣтуютъ противъ колотьевъ и другихъ простудныхъ припадковъ салатъ изъ весеннихъ листьевъ маргаритки. Наконецъ, толченая трава этого растенія прикладывается для очищенія и заживленія старыхъ ранъ, а отваромъ всѣхъ частей растенія примачиваются затвердѣлыя шейныя железы, для ихъ разогнанія. Отваръ готовится изъ горсти травы на 8 унц. кипятку; его принимаютъ два или 3 раза въ день. Въ деревняхъ траву маргаритокъ пьютъ отъ надсады, происходящей отъ поднятія большихъ тяжестей. Для этой цѣли приготавливаютъ отваръ изъ двухъ горстей цвѣтущихъ маргаритокъ на бутылку воды, которую увариваютъ до половины. Процеженный отваръ пьютъ въ теченіе двухъ недѣль ежедневно на тощакъ по рюмкѣ, прибавляя въ него по чайной ложкѣ хорошо растертой печной сажы.

Материнка, душица обыкновенная, микоранъ. Это растеніе полезно для разведенія густыхъ мокротъ, укрѣпленія разслабленныхъ органовъ и исцѣленія

внутреннихъ, особенно легочныхъ и маточныхъ поврежденій. Кромѣ того ее можно съ успѣхомъ употреблять въ кашлѣ, удушьи, мокротной чахоткѣ и блѣдной женской немочи, происходящей отъ неправильнаго очищенія или запора мѣсячныхъ кровей. Для наливки 2 драх. сухой травы кладутъ на 6 унц. горячей воды; пьютъ ее съ медомъ, вмѣсто чаю. Траву съ цвѣтными верхушками, истертую въ порошокъ, нюхаютъ отъ насморку и головной боли.

Морошка, мамура. Ягоды ея употребляются въ цингѣ чахоткѣ и кровохарканіи. Ихъ даютъ больнымъ ѣсть по желанію или въ видѣ варенья, примѣшивая къ питью.

Мыльнянка, мыльная трава. Корень и листья употребляются въ венерическихъ болѣзняхъ, въ отварѣ въ соединеніи съ сладкогоркимъ и съ можжевельнымъ деревомъ или съ волчьимъ лыкомъ. Кромѣ того они полезны въ ломотныхъ членовыхъ боляхъ, застарѣломъ ревматизмѣ, брюшныхъ завалахъ, затвердѣніи железъ, желтухѣ, запорѣ кровей, цинготномъ худосочіи, простудномъ кашлѣ, тихой изнурительной лихорадкѣ; воспаленіи легкихъ, начальной водяной болѣзни, ипохондріи, сухоткѣ и глистныхъ припадкахъ. Снаружи свѣжее съ корнемъ растеніе, истолченное въ мякоть прикладывается для очищенія кожныхъ болѣзней и нечистыхъ язвъ. Для отвара на $\frac{1}{2}$ унц. корня берется фунтъ воды, которую кипятятъ пока останется 8 унц. отвара;

его принимаютъ по чайной чашкѣ нѣсколько разъ въ день. Свѣжихъ листовъ кладутъ горсть на то же количество воды; отваръ этотъ употребляютъ для омыванія кожныхъ болѣзней и для припариванія ломотныхъ опухолей. Свѣже-выжатый сокъ изъ всего растенія даютъ на тощахъ отъ 5 до 6 унц. Изъ корней мыльной травы, репейника, можжевельника и хмѣлевыхъ корешковъ, хорошенько изрубивъ ихъ приготавливаютъ кровоочистительный отваръ, который нисколько не уступаетъ въ приносимой имъ пользѣ дорогимъ иноземнымъ т. н. кровоочистительнымъ деравамъ. На бутылку воды кладутъ 2 лота этого сбора, увариваютъ до половины и пьютъ ежедневно по 2 стакана.

II.

Песій гроздь, жимолость благовонная и другой видъ жимолости — *жимолость козья*. Свѣжіе толченые листы и выжатый сокъ прикладываются къ нечистымъ язвамъ, лишаямъ и другимъ кожнымъ пятнамъ, отваръ листовъ употребляется для полосканія въ жабѣ; наливка цвѣтовъ полезна для утоленія колотья рѣзи, въ животѣ, бывающихъ послѣ родовъ, при недостаточномъ очищеніи и припадкахъ мочевыхъ путей. Для этого отвара берутъ 2 драхмы листовъ на 6 унц.

воды;—употребляютъ вмѣсто чаю; или щепоть цвѣтовъ наливается тѣмъ же количествомъ воды.

Просвирки. Въ видѣ наливки листья и цвѣты употребляются при воспаленіи дыхательныхъ органовъ.

Р.

Розмаринъ. Его принимаютъ во внутрь въ формѣ водяной наливки, которую пьютъ какъ чай при пораженіи нервной системы, блѣдной немочи и хронической діареѣ; а въ формѣ отвара, который полезенъ для укрѣпленія нервовъ, предупрежденія антонова огня и возстановленія чувствительности въ членахъ, пораженныхъ антоніей, розмаринъ употребляется снаружи.

Росьянка круглолистная. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи отваръ листьевъ этого растенія употребляютъ противъ водяной болѣзни и перемежающихся лихорадкахъ.

С.

Стручечникъ. Во многихъ мѣстахъ, поселяне сушатъ его листья на солнцѣ и затѣмъ настилаютъ ихъ на постель дѣтей, страдающихъ англійскою болѣзною; отваръ корня есть также испытанное средство противъ этой же болѣзни.

Т.

Тавола питковинная, трясушка. Этой травѣ принадлежать свойства *Ватера*, см. эту траву.

Тминъ употребляется, какъ *Анисъ*.

Тростникъ;—корень его въ отварѣ полезенъ какъ полосканье при ранахъ въ полости рта.

Троичный цвѣтъ, веселые глазки, анютины глазки. Они входятъ въ составъ упомянутого при описаніи черной смородины противозолотушнаго набора.

Ч.

Чечина трава *юрецъ водоперечный*, *водяной перецъ*, *почечуйникъ*; *собачій перецъ* Снаружи толченая трава прикладывается къ ножнымъ водянымъ опухолямъ, для разведенія твердыхъ холодныхъ опухолей, очищенія шелудивыхъ струповъ и отдѣленія помертвѣлости. Внутрь, по причинѣ ѣдкости, траву эту принимать опасно, хотя нѣкоторые и рекомендуютъ его въ почечуѣ и каменной болѣзни.

Чистотѣль. Прежде свѣжій сокъ его употребляли противъ разстройства пищеваренія, страданій печени брюшномъ полнокровіи и проч. Разрѣзанную въ свѣжемъ состояніи траву совѣтуютъ класть въ чулки противъ недостатка мѣсячныхъ отдѣленій и при потѣ ногъ; ее также рекомендуютъ противъ чесотки. Сокомъ чистотѣла довольно успѣшно сводятъ бородавки.

Чумный корень, *блокопытникъ чумный*, *двасильный лопутникъ*. Корень и листья употребляютъ въ простудномъ кашлѣ, удушьи, ипохондріи, истерикѣ и падучей болѣзни. Снаружи толченые листья прикладываются въ видѣ катаплазмы къ ногамъ для разведенія водяныхъ оте-

ковъ и въ подагрѣ. Въ порошокъ даютъ съ медомъ по 1 драхмѣ; но чаще корень пьютъ въ отварѣ, съ прибавленіемъ уксуса и меда; для этого отвара 1 унцію корня кладутъ за фунтъ воды.

Ш.

Шлемовникъ, *щитовникъ*. Крестьяне нѣкоторыхъ мѣстностей употребляютъ водяную наливку шлемовника противъ простуднаго озноба. Съ этою цѣлю они пьютъ ее на ночь по кружкѣ и болѣе; а нѣкоторые вмѣсто водяной наливки пьютъ молочный отваръ щитовника.

Я.

Яблоя. Сладкія яблоки дѣйствуютъ слабительнымъ образомъ, кисляя — вяжущимъ; сырыя у людей съ слабымъ желудкомъ производятъ вѣтры; варенныя же составляютъ легкую здоровую, укрѣпляющую грудь пищу. Отваръ и сиропъ укрощаютъ кашель; сокъ ихъ уничтожаетъ запоры.

ляется березовая зола, которую, завязавъ въ кисею, впускаютъ въ кастрюлю, что удерживаетъ зеленый цвѣтъ. Зеленъ солится во время кипѣнія.

Б р ю к в а.

Очищенную брюкву, нарѣзать въ небольшіе длинные кусочки и бросить въ холодную воду, поставить вариться, когда начнетъ кипѣть и покажутся пузырьки, слить воду и налить процеженнымъ и увареннымъ бульономъ бараньимъ или свинымъ; можно положить и мясо, чтобы вмѣстѣ доваривалось. Когда брюква будетъ мягкой, взять большую ложку масла, поджарить съ ложкою муки какъ на соусъ, развести брюквеннымъ бульономъ, всыпать сахару по вкусу и вскипятить это два раза. Подправка дѣлается ко всѣмъ овощамъ одинаково и называется поджиганіемъ, солить нужно зеленъ когда она варится. Вмѣсто бульона, можно употреблять одно масло и въ немъ тушить.

С в е к л а.

Вымытую свеклу налить водой и поставить вариться. Когда будетъ мягкой вынуть, очистить
Лѣчебникъ-травникъ.

Приготовление полезныхъ для здоровья блюдовъ, изъ зелени и овощей.

Кто хочетъ быть здоровымъ и употреблять въ пищу зеленъ и овощи, тому предлагается испытаннымъ, указаннымъ ниже способамъ приготовления кушаній какъ изъ зелени, такъ и изъ овощей.

Объ употребленіи зелени.

Первымъ условіемъ при покупкѣ зелени это время года; цѣны бываютъ разныя: весною, когда едва показывается—зеленъ очень дорога, лѣтомъ же, когда ее очень много и осенью, когда продавцы стараются ее сбыть—зеленъ несравненно дешевле. Каждый сортъ овощей имѣетъ свои особыя свойства. При варкѣ всѣхъ несочныхъ зеленей надо всегда всыпать, соображаясь съ количествомъ, полчайной ложечки или больше соды, что ускоряетъ ихъ варку. Для шпината, зеленыхъ бобовъ, зеленого горошка, употреб-

кожу и нашинковать въ тонкіе кусочки. Въ кастрюлю положить большой кусокъ шпигу, распустить, всыпать ложку муки, немного рубленнаго луку и дать вскипѣть вмѣстѣ, смотрѣть чтобы не зарумянилось; положить тогда свеклу, посолить, влить полстакана или больше (смотря по количеству свеклы) варенаго хорошаго уксуса, двѣ ложки сметаны или сливокъ, накрыть и тушить около получаса. Можно свеклу рубить, но шинкованная красивѣе и вкуснѣе.

Зеленые бобы или фасоль.

Зеленые бобы вкусны пока еще очень молоды. Отбросить волокна, которыя идутъ въ длину бобовъ, нашинковать очень мелко; отдѣльно сварить и очистить бульонъ изъ фунта или больше баранины или говядины, процѣженнымъ бульономъ вмѣстѣ съ говядиной налить бобы, которые должны быть прежде обварены, посолить, положить немного рубленной петрушки и варить пока бобы не сварятся вмѣстѣ съ говядиной. Взять большую ложку масла, вскипятить съ ложкою муки, развести бульономъ, вскипятить вмѣстѣ и подавать съ говядиной. Можно также варить бобы безъ говядины, бросить ихъ въ соленый кипятокъ и варить до мягкости, тогда отцѣдить воду и облить холодною,

это поправляетъ цвѣтъ, потомъ положить въ кастрюлю много масла, ложку бульона или воды, немного рубленной петрушки, кусокъ сахара, положить бобы и тушить съ полчаса, подавая на столъ, залить масломъ, подрумяненнымъ съ сухарями.

Турецкіе бобы.

Самое лучшее время на турецкіе бобы есть отъ 1 іюля по 15 октября; вообще бобы хороши только тогда, когда они молоды. Положить въ рѣчную воду турецкіе бобы или бобы простые, посолить въ то время, когда они варятся и варить на небольшомъ огнѣ около двухъ часовъ. Когда будутъ мягки, взять масла, вскипятить съ мукой, положить немного рубленнаго луку, развести бульономъ или бульономъ грибнымъ съ уксусомъ; слить воду съ бобовъ и положить бобы въ соусъ, подавать къ столу, обложивъ жареною колбасою или маленькими колбасиками (сосисками). Молодые бобы очень вкусны, сваренные въ соленой водѣ, а послѣ облить масломъ зарумяненнымъ съ булкой или лукомъ.

Бѣлые бобы съ помидорами.

Зимою это очень вкусное блюдо. Сварить въ соленой водѣ 1 фунтъ бобовъ. Положить въ кастрюльку ложку масла и влить 2 ложки поджаренныхъ въ маслѣ и протертыхъ помидоровъ, посыпать муки на кончикъ ножа, немного крѣпкаго краснаго перца, отлить бобы, положить въ соусъ и вскипятить вмѣстѣ. Подавать къ баранинѣ съ битками или сосисками.

Зеленый горохъ по французски.

Горошекъ долженъ быть свѣжій, мелкій и совсѣмъ зеленый. Четыре стакана вылуценнаго горошка всыпать въ кастрюльку величиною въ 8 стакановъ, положить ложку масла, влить 2 стакана воды, всыпать немного соли и 2 лота мелкаго сахару; покрыть кастрюлю и поставить на слабый огонь на полчаса. Тогда подбавить опять хорошую ложку масла, потрясти кастрюлю чтобы вымѣшалось, поправить, если мало сладокъ, добавить для вкуса сахару и сейчасъ снять съ огня.

Зеленый горошекъ сушеный.

Сушеный горошекъ нужно за нѣсколько часовъ до приготвленія намочить въ хорошемъ

молокѣ; пропорція четверть фунта на 4 особы; когда молоко войдетъ совсѣмъ въ горошекъ, вымыть его и варить какъ свѣжій, съ тою разницею, что этотъ варится дольше и требуетъ больше сахара. Подается съ телячьими котлетами или гренками.

Горохъ сахарный въ стручкахъ.

Вымытые стручки сахарнаго горошка сварить въ соленой водѣ, слить воду, когда уварятся до мягкости и подать къ столу, подавая къ этому отдѣльно свѣжее растопленное масло.

Рѣпа и кольраби.

Молодая рѣпа, разрѣзанная ломтиками или пополамъ, тушится въ маслѣ, подливая по немногу бульона; когда уварится до мягкости, подправить масломъ съ мукою, всыпать немного сахару и молодой рубленой петрушки. Когда рѣпа не очень молода, нужно ее нарѣзать кусочками и тушить въ маслѣ, или варить съ говядиною какъ брюкву, сперва сваривъ въ соленой водѣ. Осенью, когда рѣпа имѣетъ уже внутри толстыя волокна, подаютъ ее обыкновенно нафарширо-

ванную; фаршъ можетъ быть изъ рыбы, мяса или раковъ, самый лучшій изъ баранины. Очищенную рѣпу, срѣзать сверху, выдолбить середину, изрубить мелко кусокъ очень жирной сырой баранины, положить булки намоченной въ молокъ и выжатой, соли, перцу и печенаго лука; размѣшать хорошо и начинять этимъ рѣпу. Въ кастрюлю положить порядочный кусокъ масла, уложить рѣпу одну возлѣ другой, накрывъ каждую срѣзанными верхушками, налить немного бульономъ или водою и тушить подъ крышкою, пока не будутъ совсѣмъ мягкими, нужно чаще смотрѣть чтобы не пригорѣли и встряхивать почаще кастрюлю: когда бульонъ весь высушится и останется одинъ жиръ, вынуть рѣпу, обсыпать тертой булкой и подать къ столу. Съ рыбою дѣлается такимъ же образомъ. Когда начинаютъ старую рѣпу, варенымъ или жаренымъ мясомъ, нужно прежде сварить ее въ соленой водѣ, а въ фаршъ добавить достаточно масла и кусокъ свѣжаго изрубленнаго шпига, а остальное дѣлать, какъ сказано выше. Укладывая въ кастрюлю слѣдуетъ каждую рѣпину обвязать ниткою, чтобы верхъ не свалился.

Грибы тушеные въ сметанѣ.

Очистить и выполоскать грибы, пошпиговать, выполоскать въ холодной водѣ; положить въ

кастрюлю большой кусокъ масла, положить грибы, закрыть крышкою и тушить, во время тушенія мѣшать часто ложкою, чтобы не пригорѣли, посолить и всыпать рубленаго луку; когда будутъ около часу тушиться, влить нѣсколько ложекъ сметаны и тушить, пока не сгустѣютъ.

Грибы сушеные въ родѣ свѣжихъ.

Молодые грибы сушеные лѣтомъ на солнцѣ, употребляются такъ: нужно ихъ нѣсколько разъ обварить кипяткомъ и выжимать крѣпко, чтобы вода сошла, вода эта будетъ горька какъ полынь; это нужно повторить нѣсколько разъ, наконецъ залить ихъ молокомъ на десять часовъ, и когда молоко вберется въ грибы, тушить ихъ какъ свѣжіе со сметаной и масломъ.

Каштаны жареные въ маслѣ.

Извѣстно, что самая лучшая начинка къ индѣйкѣ это каштаны. Къ каждой домашней птицѣ, въ особенности къ уткамъ, индѣйкамъ и каплунамъ подаются каштаны отдѣльно приготовленные, и обкладываютъ ими жаркое на блюдѣ. На одну утку или каплуна берется 1 фунтъ,

а на индюшку отъ 2—3 фунтовъ свѣжихъ каштановъ; положить ихъ въ холодную воду и не накрывая варить какъ картофель, посолить немного, когда будутъ вариться пробовать, готовы ли, слѣдующимъ образомъ: когда кожа легко сходитъ и сами каштаны мягкіе, то слить воду, снять осторожно кожу и на фунтъ каштановъ взять четверть фунта свѣжаго несоленого масла, распустить его въ кастрюлѣ, положить въ него очищенные каштаны, четверть фунта толченаго сахару, вымѣшать хорошо, поставить на небольшой огонь на 10 минутъ, мѣшая постоянно, и обложить имъ жаркое.

Браунколь съ каштанами.

Браунколь очень вкусный, когда немного промерзнетъ, тогда взять только верхніе листки, вымыть и сварить въ горячей водѣ, когда будетъ мягкимъ, и слить воду, промыть холодною водою, выжать и тогда изрубить. Растереть на теркѣ двѣ моркови, одну свеклу и одну луковицу, размѣшать съ браунколемъ, положить въ кастрюлю жиръ, свѣжій шпигъ или масло, поджарить съ мукой часто мѣшая, положить браунколь, посолить, подлить бульону и тушить подъ крышкою пока сгустѣетъ. Къ этому подаются каштаны, которые нужно испечь въ духо-

вой печкѣ или сварить въ водѣ, очистить отъ кожи, положить въ густой сахарный сиропъ, вскипятить минуту, размѣшать и вынимая одинъ послѣ другаго, укладываютъ кругомъ блюда около капусты. Это блюдо можно подавать обложеною ветчиною, солониною, гусиными полотками или копченымъ языкомъ.

Цвѣтная капуста.

Нельзя назначить время для цвѣтной капусты, весь годъ можно сохранить ее въ погребѣ для гарнировъ, но самая вкусная бываетъ въ іюлѣ, августѣ и сентябрѣ. Самая лучшая цвѣтная капуста должна быть очень бѣлою и имѣть цвѣты твердые и сжатые. Очистить отъ листиковъ и кожицы, которая бываетъ на стеблѣ, положить въ чашку съ холодною водою въ которую нужно влить полъ стакана уксуса, это дѣлается для того, чтобы мошки и червячки, которые бываютъ въ капустѣ, вышли всѣ на верхъ. Въ большой кастрюлѣ вскипятить 8 стакановъ воды, чтобы капуста не варилась тѣсно, бросить ее туда на 5 минутъ чтобы вскипѣла; тогда отцѣдить эту воду, бросить капусту въ другую также горячую, посолить и варить, пока не сдѣлается мягкой, что очень легко узнать, взявши въ руки. Подавать ее нужно съ масломъ, под-

румяненномъ съ сухаремъ и съ голландскимъ соусомъ.

А р т и ш о к и.

Самые лучшіе артишоки бываютъ въ маѣ и октябрѣ выбирать нужно не слишкомъ твердые и не очень высокіе. Варятся они какъ спаржа, однако немного больше; чтобы узнать готовы ли, нужно вилку продѣть насквозь, если войдетъ легко, то готовы. Вынуть изъ воды и положить на рѣшето, чтобы вода сошла хорошо, отобрать волокна которыя бываютъ въ низу и подать къ столу, подавая къ нимъ масло или бѣлый соусъ. Во Франціи ѣдятъ спаржу и артишоки холодными и подаютъ къ нимъ уксусъ и прованское масло.

Капуста сафой.

Очистить капусту отъ лишнихъ листьевъ, разрѣзать ее на 4 части, вымыть и вскипятить два въ горячей водѣ. Процѣдить, выжать крѣпко воду; положить въ кастрюлю кусокъ масла, туда же положить капусту, залить говяжьимъ или бараньимъ бульономъ, прикрыть и тушить пока сгустѣетъ. Отдѣльно вскипятить до желта-

го цвѣта ложку масла съ ложкою муки и подрумяненнымъ сахаромъ, залить этимъ соусомъ капусту и немного потушить. Также дѣлаютъ фаршированную капусту. Капусту сварить въ соленой водѣ и выжать, послѣ накладывать фаршъ между листьями; фаршъ дѣлается изъ вареной говядины какъ на пирожки, но лучше приготовить его какъ для рѣпы, изъ сырой говядины съ прибавленіемъ рубленого жира какъ на фрикадельки; все это уложить въ кастрюлю и тушить какъ выше сказано. Подавая къ столу, на блюдѣ обсыпать сухаремъ и залить соусомъ. Такъ можно фаршировать сафой и простую бѣлую капусту.

Капуста свѣжая, приготовленная какъ кислая.

Свѣжую капусту употребляютъ больше всего отъ августа до декабря; хорошая капуста должна быть бѣлою. Многие употребляютъ капусту, сперва не обваривая ее, это очень не здорово, необходимо обваривать всегда предъ употребленіемъ. Шинкованную капусту бросить въ кипятокъ и держать на огнѣ минутъ десять, процѣдить, перелить холодною водою, хорошо выжать, и положить въ кастрюлю и залить, считая на одну большую головку два стакана бульона, рюмку очень

крѣпкаго уксуса, четверть фунта свѣжаго жиру, шпига или масла, перцу, луку, тушить подъ крышкой не менѣе трехъ часовъ на небольшомъ огнѣ. Положить кусочекъ сахара и когда утушится до мягкости, взять ложку муки, ложку жиру и немного рубленаго луку, поджарить и подправить этимъ капусту. Иначе нашпигованную капусту обварить кипяткомъ и оставить въ немъ на десять минутъ; выжать изъ нее крѣпко воду и положить въ кастрюлю вмѣстѣ съ жиромъ, залить уксусомъ, водой или бульономъ, прибавить тертаго луку, посолить и тушить довольно долго; вмѣсто уксуса можно положить нарѣзанныхъ кислыхъ яблоковъ, столько, чтобы капуста была кислюю; когда сдѣлается мягкою, подправить, какъ сказано выше, ложкою муки вскипяченною съ ложкою жиру, кто любитъ прибавить рубленаго луку. Можно положить также кусокъ сахару.

Тушенная красная капуста.

Нашпиговать тонко ножемъ капусту, посолить или обварить, выжать крѣпко; положить въ кастрюлю свѣжаго жиру или шпигу, вытопленнаго безъ шкварокъ, положить капусту, залить бульономъ пополамъ съ краснымъ виномъ и тушить подъ крышкою; когда уварится и будетъ мягкою, влить хорошаго уксуса, прибавивъ еще вина, по-

ложить нѣсколько кусковъ сахару и подправить мукою поджаренною въ ложкѣ жиру; луку совсемъ не брать къ этой капустѣ.

Кислая капуста

Кислую капусту чаще всего приготовляютъ съ говядиной, то есть берутъ кусокъ свинины, простой говядины или какого нибудь соленаго мяса, варятъ не много; потомъ моютъ и заливаютъ процеженнымъ бульономъ капусту. Бросить нѣсколько сушеныхъ обваренныхъ грибовъ и варить пока мясо и капуста будутъ готовы. Подавая, подправить поджареннымъ шпигомъ съ ложкою муки и нѣмного луку. Если капуста варилась со свининой, то ее нужно нарѣзать въ небольшіе куски, кости отбросить и обложить капусту свининой.

Кислая постная капуста.

Выжать хорошо сокъ изъ кислой капусты, положить въ кастрюлю постнаго масла и туда же положить капусту; залить грибнымъ бульономъ, и вываренные грибы нашинковать, нарѣзать мелко луку и тушить все вмѣстѣ до мягкости. Подавая

подправить масломъ съ мукою, вскипятить еще разъ вмѣстѣ и обложить капусту жаренымъ въ постномъ маслѣ налимомъ или другою рыбою. Также готовится тушенная скоромная капуста со шпикомъ и жиромъ, которая подается съ колбасами или какимъ-нибудь жаркимъ. Какъ готовить на зиму кислую капусту можно видѣть въ книгѣ „Единственныя практич. правила“.

Свѣжая капуста съ яблоками.

Нашинковать нѣсколько головокъ капусты, обварить и выжать воду. Положить въ кастрюлю, влить немного бульону или воды, посолить, влить достаточно жиру или шпику растопленного безъ шкварокъ; нѣсколько очищенныхъ кислыхъ яблоковъ (чтобы придать кислоту капустѣ) закрыть кастрюлю и тушить. Передъ самымъ обѣдомъ, положить туда кусокъ сахара и подправить мукою съ масломъ, какъ обыкновенно всѣ соусы изъ зелени.

Брюссельская капуста.

Самая лучшая брюссельская капуста бываетъ отъ ноября до февраля. Обрѣзать отъ ствола маленькіе кочанки, облить кипяткомъ и варить въ свѣжемъ молокѣ. Отцѣдить, положить на блюдо, облить поджареннымъ масломъ, обсыпать сухарями.

Капуста фаршированная.

Хорошій бѣлый кочанъ капусты, залить соленымъ кипяткомъ, когда будетъ мягкій, вынуть, разрѣзать на четыре части и наложить между листьями слѣдующій фаршъ: одинъ фунтъ сырой говядины, свинины или баранины, мелко срубить, вымѣшать съ размоченнымъ въ водѣ мякишемъ бѣлаго хлѣба, добавить съ четверть фунта мелко изрубленного говяжьего жиру, соли, перцу; — положить въ кастрюлю кусокъ масла, положить капусту и когда подтушится, подлить соусу составленнаго изъ подрумянившейся ложки масла съ ложкою муки, заколерованнаго жженнымъ сахаромъ и разбавленнаго крѣпкимъ бульономъ.

Листья капусты фаршированные.

Большой кочанъ капусты отварить въ цѣлости, когда будетъ почти мягкій, слить воду, простудить, отнять листья и посолить. Отдѣльно приготовить обыкновенную начинку изъ рубленнаго мяса, куска внутренняго говяжьего жиру, печенаго и протертаго луку, сухаря, соли, перцу, одно яйцо. Положить въ кастрюлю масло, считая на 1 фун. мяса четверть фунта масла, добавить ложку бульона, положить начинку и вымѣшать. Фаршемъ этимъ начинять приготовленныя листья, свертывать каждый отдѣльно, обмокнуть въ яйцѣ, посыпать сухаремъ и жарить на сковородѣ въ

маслѣ. Когда всѣ сжарены уложить на мѣдное или жестяное блюдо, полить бѣлымъ соусомъ и поставить на 10 минутъ подъ плиту. Соусъ готовится слѣдующимъ способомъ: ложку масла вскипятить на бѣло съ ложкою муки, развести съ полъ стаканомъ сырыхъ сливокъ и полить капусту.

Картофель.

Картофель варятъ разными способами, а главное зависитъ отъ самаго картофеля; онъ долженъ вариться въ холодной водѣ, на небольшомъ огнѣ и тогда только можетъ быть хорошимъ. Пока онъ молодъ и даже когда постарше, нужно его скоблить жестяною ложкою, но не срѣзать ножомъ кожи; многіе варятъ картофель въ соленой водѣ, но лучше варить очищенный, налить холодной водой, а когда готовъ слить воду, посыпать солью и нѣсколько разъ встряхнуть горшокъ или кастрюлю, чтобы соль вошла въ картофель. Въ молодой картофель нужно положить пучекъ зеленой петрушки для вкуса, а когда сольютъ воду, сейчасъ положить ложку сырого свѣжаго масла, немного рубленной петрушки и соли, накрыть кастрюлю и встряхивать его, пока масло не войдетъ въ картофель, тогда поставить на огонь еще на двѣ минуты.

Картофель молодой вареный безъ воды.

Очистить молодой картофель за 5 минутъ передъ тѣмъ какъ нужно ставить его, чтобы не выросла вторая на немъ кожа, положить въ кастрюлю или желѣзный котелокъ, положить ложку масла, всыпать мелко нарѣзанной зеленой петрушки и соли, покрыть и поставить на полчаса на плиту, или же вставить въ другую кастрюлю съ кипяткомъ.

Жареный картофель.

Очищенный, вымытый и обваренный картофель, нарѣзать ломтиками и посолить; положить въ кастрюлю немного масла, вскипятить, положить въ него картофель, поставить на уголья или на большой огонь и тушить, часто встряхивая, пока не зарумянится. Такой картофель подается къ бифстексу, къ жаренному филе и т. п. Можно желѣзною ложечкою вырѣзать шарики изъ картофеля и жарить ихъ въ маслѣ, пока не зарумянятся. Къ браунколю или къ филе, можно обвалить картофель въ муку, перемѣшанной съ сахаромъ и тогда положить его въ масло (непримѣнно подрумяненное масло).

Картофель со сметаною.

Сваренный въ шелухѣ картофель очистить скоро, чтобы не остылъ, нарѣзать ломтиками, посолить, положить въ кастрюлю ложку масла. Картофель и нѣсколько ложекъ хорошей сметаны, накрыть и тушить, пока сметана не выжарится. Можно положить немного тертаго укропа и луку. Также хорошъ картофель, сваренный безъ шелухи, передъ тѣмъ какъ варить, на дно кастрюли нужно положить горсть рубленнаго луку; слить воду, положить ложку масла, нѣсколько ложекъ хорошей сметаны, соли и все вмѣстѣ растереть въ кастрюлѣ.

Картофель

Нарѣзанный ломтиками картофель обдать кипяткомъ, слить воду и положить въ кастрюлю, въ которую прежде нужно положить на 10 картофелинъ ложку свѣжаго масла, немного соли, влить двѣ ложки горячей воды, накрыть кастрюлю крышкою и тушить на небольшомъ огнѣ минутъ 20, встряхивая часто кастрюлю, но не мѣшая. Кто любитъ можетъ вмѣсто воды налить 2 ложки сливокъ и посыпать рубленнымъ укропомъ или петрушкой, такъ приготовленный даже и старый картофель бываетъ очень вкусенъ. Кто

любитъ лукъ то можно въ сырой еще картофель положить немного рубленнаго обвареннаго луку. Молодой картофель не приготавливаютъ никогда съ лукомъ и не обливаютъ растопленнымъ масломъ, но когда сольютъ воду, нужно посыпать его солью и тогда положить ложку свѣжаго масла и посыпать рубленной петрушки, подержать на огнѣ, встряхивая кастрюлю пока масло не разойдется.

Картофель „à la Lyonnaise“.

Очистить и нарѣзать тонкими ломтиками хорошаго сорта картофель и вытереть до-суха въ салфеткѣ. Положить въ кастрюлю одинъ фунтъ флитуры, когда разогреется, всыпать картофель и жарить на большомъ огнѣ, потряхивая кастрюлю, пока не подрумянится. Вынуть дуршлаковой ложкой, посолить и выжать немного лимоннаго соку. Подаютъ картофель подобнымъ способомъ приготовленный, ко всякому жареному мясу. На маслѣ жарить его не возможно.

Картофель съ грибами.

Сварить свѣжіе или сухіе грибы, мелко ихъ изрубить и поджарить въ маслѣ, сваренный и

очищенный картофель нарезать ломтиками, взять несколько ложек сметаны, сухого тертого сыра и смешать все это вместе, положить на блюдо или в кастрюлю, добавить ложку масла, обсыпать тертым хлебом и поставить в горячую печь, не меньше как на полчаса.

Картофель начиненный грибами.

Обваренные, и после сваренные свежие грибы, изрубить как можно мельче. Поджарить в масле две изрубленные луковицы, смешать с грибами, посолить, посыпать перцем, положить немного сухаря, два яйца и вымешать все в массу. Очищенный сырой картофель, выдолбить, наполнить внутри массой, закрыть срезанными верхушками, уложить в кастрюлю один около другого, залить хорошо маслом (которого должно быть много) влить несколько ложек распущенного сухого бульона или грибного отвара, накрыть кастрюлю крышкой и тушить до мягкости.

Пышки из картофеля.

Постом очень хорошо делать картофельные пышки. Сварить четверку очищенного картофеля

с солью, когда уварится до мягкости, слить воду, встряхнуть кастрюлю как обыкновенно, наконец стереть на терке или скалкой в горшок так чтобы не было комочков, но лучше растереть на терке. Влить 2 ложки сметаны, ложку масла и 3 желтка, соли по вкусу и растертого на терке луку если кто любит, это все размешать в массу и ложкою накладывать на противень, смазанный маслом, круглые кучки, смазать сверху разбитым яйцом, обсыпать сухарем и поставить в печь довольно горячую. Такие пышки подаются после супа, вместо пирожков или гарнируют ими жаркое.

Картофель с селедкой.

Сваренный картофель нарезать ломтиками. Взять две вымоченные селедки, изрубить мелко, две луковицы изрубленные поджарить в масле. Взять кастрюлю, смазать внутри маслом, уложить в нее рядами картофель, селедку и лук, обсыпать сухарями, залить растопленным маслом с луком и поставить в печь на четверть часа.

Ригée изъ картофеля.

Очищенный картофель сварить и пока горячій протереть сквозь рѣшето, въ протертый положить ложку масла, развести сливками, хорошо размѣшать до густоты и согрѣть на огнѣ, только не варить. Такое пюре очень хорошо для обкладыванія бараньихъ котлетъ или говядины съ краснымъ соусомъ. Ежели нѣтъ сливокъ можно положить сметаны, но тогда нужно всыпать ложечку толченаго сахару.

Картофель по-французски.

Картофель очищенный и сваренный, растереть на теркѣ, размѣшать со сливками и съ двумя яйцами (смотря по количеству картофеля) сдѣлать въ рукахъ комочки въ родѣ продолговатаго картофеля, обмакнуть каждый въ яйцо, обсыпать тертою булкой и жарить въ горячемъ маслѣ.

Морковь.

Самое лучшее время для моркови отъ 1-го мая по 1-ое октября, послѣ этого времени, она теряетъ свою нѣжность и тогда ее употребляютъ только

на гарниры вмѣстѣ съ другою зеленью. Молодую морковь, бросить на 5 минутъ въ кипятокъ, процѣдить воду, перемыть въ холодной и обтереть чистымъ полотенцемъ, чтобы сошла кожица, срѣзать зеленую часть головки и кусочекъ хвостика, послѣ варить въ цѣлости или нарѣзанную въ круглые кусочки. Морковь пока еще очень молода, тушится въ цѣлости съ масломъ. Добавляя молодого горошку или спаржи, до половины уваренную морковь смѣшать съ отвареннымъ въ соленой водѣ горошкомъ или спаржею и тушить вмѣстѣ недолго, заливъ немного бульономъ, потомъ подправить мукою съ масломъ, посыпать сахаромъ и укропомъ и подать къ столу. Когда морковь старше, нужно ее оскоблить, нарѣзать на доскѣ продолговатыми полосками, насыпавъ сперва на доску толченаго сахару; положить въ кастрюлю довольно много масла, положить морковь, залить немного бульономъ и тушить подъ крышкою; когда до половины утушится, нужно посолить, всыпать ложку муки, постоянно мѣшая, положить немного сахару и опять тушить пока не будетъ готово. Можно также готовить морковь протертую, тѣмъ болѣе, когда она старше, нужно ее оскоблить, вымыть и поставить вариться, наливъ бульономъ изъ отваренной баранины, которую также нужно доваривать вмѣстѣ съ морковью, но чтобы соуса было немного, когда морковь будетъ до половины готова, вынуть растереть каждую на теркѣ, поджарить масло съ

ложкою муки, развести бульонъ въ которомъ варилась морковь, положить туда и морковь, немного сахару и тушить вмѣстѣ. Къ моркови подаются непременно гренки (смотри прибавленіе къ супу) или шарики изъ заварнаго тѣста, которые дѣлаются такъ: приготовить тѣсто какъ на заварной пудингъ, сдѣлать изъ него шарики и бросать въ растопленное масло или жиръ, жарить пока не будутъ готовы, вынимать ихъ шумовкою и укладывать вокругъ соуса; такіе шарики очень вкусны съ гороховымъ супомъ.

Рыжики въ маслѣ.

Положить въ кастрюлю полфунта хорошаго масла на четверку рыжиковъ, вымыть ихъ нѣсколько разъ въ холодной водѣ, высыпать грибы въ масло, посолить и жарить на угольяхъ или на небольшомъ огнѣ. Когда грибы будутъ уже въ соусѣ, бросить изрубленнаго мелкаго луку, нарѣзанный корешекъ толстой петрушки и сельдерея, всего двѣ горсти, накрыть кастрюлю и тушить на небольшомъ огнѣ, встряхивая часто кастрюлей, чтобы не пригорѣли и когда останется одно масло, тогда насыпать немного перцу и горсть сухаря, размѣшать, подогрѣть еще немного и подавать къ столу. Это кушанье очень вкусно, и зимой можетъ замѣнить свѣжіе грибы

(смотри: „Единств. практ. правила“), гдѣ описано какъ сохранять грибы.

С п а р ж а.

Лучшее время для спаржи—это конецъ апрѣля и май. Нужно выбирать спаржу бѣлую съ темно-фіолетовыми головками, очистить ихъ отъ пленокъ или кожницы осторожно, держа ножъ лежащимъ на спаржѣ; никогда не связывать больше десяти спаржей, если тоньше, то двѣнадцать вмѣстѣ, бросить ихъ въ кипятокъ довольно соленый и варить на сильномъ огнѣ минутъ двадцать, бросивъ кусокъ сахару и еще посолить когда варятся; вынуть изъ кипятка и мгновенно обмокнуть въ холодную воду, отвязать нитки и положить на уложенную на блюдѣ салфетку, головками на средину, залить масломъ поджареннымъ съ сухаремъ и отдѣльно подать въ соусникѣ свѣжее растопленное масло или сабаіонъ. Качество спаржи зависитъ отъ ее свѣжести и стараться ее не переварить, иначе она будетъ водяниста. Это нужно соблюдать, приготовляя вкусную зелень.

Спаржа зеленая, приготовленная въ родѣ зеленаго горошка.

Изрѣзать на мелкіе кусочки 30 штукъ зеленой спаржи, отрѣзая головки, которыя сюда не употребляются. Сварить ее въ соленой водѣ пока не будетъ мягкою, такъ чтобы растиралась въ пальцахъ. Взять ложку муки, поджарить съ ложкою масла, посыпать немного соли, ложечку толченаго сахару, положить еще ложку свѣжаго масла, 2 желтка и полстакана сливокъ, развести все вмѣстѣ на небольшомъ огнѣ, постоянно мѣшая пока не разойдется масло, когда хорошо согрѣется, положить на минуту сваренную спаржу и подавать къ столу. Это очень хорошее блюдо и полезно употребленіе не зрѣлой спаржи.

Ш п и н а т ь.

Шпинатъ можно имѣть круглый годъ, исключая большихъ морозовъ и большой жары. Очистить шпинатъ отъ стебельковъ, выполоскать очень чисто, отцѣдить воду и бросить его въ кастрюлю съ соленымъ кипяткомъ на 5 минутъ. Тогда отлить воду быстро и перелить его нѣсколько разъ холодною водою, пока не остынетъ, иначе будетъ желтымъ; чѣмъ онъ моложе и мельче, тѣмъ онъ лучше; нужно, переливая

его холодною водою, встряхивать сильно рѣшетомъ, чтобы шпинатъ остывалъ весь сразу, тогда выжать хорошо воду, изрубить его мелко на доскѣ, взять порядочный кусокъ масла, поджарить его съ ложкою муки, развести сливками и растереть въ чашкѣ, а когда шпинатъ постарше, то протереть на рѣшетѣ; положить подправку, посолить, хорошо согрѣть; но обращать вниманіе чтобы не сварилось, потому что цвѣтъ тогда не будетъ хорошъ, подавать къ столу, обкладывая котлетами, фаршированными яйцами и омлетомъ. Можно дѣлать колечки изъ заварнаго тѣста и ими убирать шпинатъ и другую зелень; но съ колечками много хлопотъ, и потому можно изъ заварнаго тѣста сдѣлать польскую лепешку, и когда испечется, нарѣзать кусками и убрать ими зелень.

Пудингъ изъ шпината.

Одинъ фунтъ мякиша бѣлаго хлѣба помочить въ молоко. Шесть желтковъ протереть съ 2 ложками масла и чайной ложечкой сахара и вымѣшать съ выжатымъ хлѣбомъ. Сварить 1 фунтъ шпината въ соленой водѣ, отцѣдить и протереть черезъ рѣшето, вымѣшать все вмѣстѣ, растереть хорошо скалкой, посолить, положить всю массу въ пѣну бѣлка, вымѣшать осторожно, влить въ

форму вымазанную масломъ, или въ салфетку и варить часъ время въ кастрюль съ кипяткомъ. Подается къ этому топленое масло, голландскій соусъ или сабаіонъ.

Щ а в е л ь .

Взять порядочный кусокъ масла, положить вмѣстѣ съ изрубленнымъ щавелемъ и тушить до мягкости, тогда сбить небольшой стаканъ хорошей сметаны съ ложкою муки, размѣшать со щавелемъ, посолить, всыпать сахару по вкусу и вскипятить. Это очень хорошій соусъ къ телячьимъ котлетамъ.

Крапива или лебеда.

Молодую лебеду, крапиву или листы молодой капусты бросить въ кипятокъ, варить какъ шпинатъ до мягкости, тогда изрубить мелко, взять порядочное количество шпигу, поджарить зелень, посолить и развести сокомъ, въ которомъ варилась свиная копченая грудинка, которой нужно обкладывать зелень. Отдѣльно сварить ячменной каши со шпигомъ, довольно крутой, и ее вмѣстѣ съ зеленью размѣшать хо-

рошо и немного потушить; подавать къ столу, убравъ грудинкой, нарѣзанной длинными кусочками.

Пирожки для зелени.

Шесть желтковъ стереть съ четвертью фунтомъ столоваго масла и 4-мя лотами сахара, тереть полъ часа, тогда высыпать полфунта муки и опять тереть хорошенько, выложить на доску посыпанною мукой, растянуть тѣсто руками и вырѣзывать разныя фигурки; помазать масломъ, посыпать сахаромъ и поставить на четверть часа въ печку, чтобы подрумянились въ золотистый цвѣтъ.

Уходъ за огородными овощами.

Совѣтуя употреблять въ пищу и зелень и овощи, считаю не лишнимъ сказать объ уходѣ за ними и культурѣ ихъ.

Такъ какъ на сѣверѣ условія ухода осложняются отъ суроваго климата, то я и постараюсь дать совѣтъ по уходу относящемуся для сѣверныхъ губерній.

Потребность огородных овощей.

Огородные овощи составляют значительно подспорье въ продовольствіи крестьянина. Кроме того, онѣ необходимы ему и для здоровья: потому что употребленіе человекомъ одной мясной и хлѣбной пищи не въ мѣру разгорячаетъ у него кровь, густитъ ее, портитъ и располагаетъ ко многимъ тяжкимъ болѣзнямъ, трудно при томъ же еще и лѣчимымъ.

Средства къ содержанію огорода.

Завести и содержать хорошій огородъ крестьянину въ сѣверныхъ губерніяхъ довольно просто. Для этого ему понадобятся: небольшой участокъ земли, малая-толика умѣнья (которому легко научиться) и самый посильный трудъ, удобно выполняемый даже женщиною.

Выборъ мѣста.

Выбрать мѣсто подъ огородъ можно *вездѣ*, лишь бы оно не было слишкомъ сыро, очень подбоисто (каменисто) и не затѣнялось бы чѣмъ-либо отъ солнца. Но лучше, конечно, если есть

возможность, назначить огородъ близъ воды (испаренія которой, во время жара, увлажняютъ растенія; а при морозѣ, ослабляютъ губительную силу его) и притомъ на полдень и такъ еще, чтобы съ сѣверной и восточной сторонъ, постройка, либо гора, либо растущія деревья, защищали-бы растенія отъ холодныхъ вѣтровъ.

Поправленіе почвы.

Какая бы почва не подошла въ огороды — ее можно поправить (вѣдь не какое обширное мѣсто онъ занимаетъ!) Случись „глина“ или „суглинокъ“ и „бѣловатый иль“, — земли, какъ известно, холодныя, тяжелыя и неспособныя къ произведенію овощей; но и ихъ можно, посредствомъ частаго и обильнаго удобренія *свѣжими* горячительными навозами, каковы: конскій, овечій и птичій, съ щедрою примѣсью къ нимъ соломы, и чрезъ посыпаніе золы, извести, разбрасываніе кожевнаго корья — обратить въ огородную почву. Подойди „песокъ“ — и съ нимъ также не мудрено справиться: стоитъ только класть на него перегнившіе навозы, особенно коровій и свиной; тину, болотный мохъ, уличную грязь и перелѣвшую щепу. И каждый изъ этихъ подсобныхъ навозовъ уменьшитъ сухость песка, свяжетъ его рыхлость и дастъ ему плодородную силу. Пусть

помѣшаютъ огороду хоть камни: и ихъ можно, напередъ, повибратъ; а потомъ, каждагодно, при пашнѣ, собирать въ кучу, и, зимою, вывозить. Про благодатный „черноземъ“ и говорить нечего: его понадобится только помягче распахать, да и дѣлать изъ него гряды.

Очередь удобренія и величина огорода.

Когда же земля въ огородѣ доведется до „хорошаго качества“, то есть, сдѣлается на пол-аршина пухла и цвѣтомъ темнобуровата, тогда ежегодно удабривать ее слѣдуетъ *не всю*, а только тѣ мѣста, гдѣ думается посадить, на слѣдующій годъ, капусту, рѣпу, брюкву, огурцы, свеклу, тыквы, укропъ и картофель (если онъ не растеть въ полѣ). Подъ рѣдку же, рѣдись и морковь навозу совсѣмъ не класть. А лукъ, чеснокъ, горохъ и бобы наровить садить на ту часть огорода, гдѣ три года и болѣе не бывало удобренія. — Величина огорода зависитъ отъ потребности.

Время вывозки навоза.

Вывозку навоза надобно дѣлать непременно осенью, (чтобы дожди, морозы и вообще продол-

жительное дѣйствіе на него воздуха, скорѣе перегноивъ его, соединило съ землею) и тотчасъ по вывозкѣ, за-орывать. И такъ на зиму въ бороздахъ и оставить.

Обработка огорода.

Весною же, когда земля нѣсколько попрочахнетъ, тогда изборонить огородъ; а когда наготово просохнетъ, тогда уже приняться и за переѣшку его, повтореніе орьбы и бороньбы. Но ранѣ этого отнюдь не обрабатывать огорода, потому что сырая почва, при шевеленіи ея, обращается въ комья, весьма трудно разбораниваемые, и, слѣдовательно, мѣшающіе произрастенію. Переѣшивать огородъ нужно не весь вдругъ, а напередъ приготовить землю подъ тѣ гряды, гдѣ будутъ засѣваться сѣмена *прямо безъ переѣдки*. Подъ капусту же и брюкву, рассада которыхъ растится особо, землю готовятъ послѣ, чрезъ нѣсколько недѣль. И вообще принять за правило, чтобы при каждой посадкѣ огородныхъ растеній, гряды были „недавно“ сдѣланныя и легко проникаемыя воздухомъ.

Разбивна грядь.

Располагать ихъ всего лучше на нѣсколько участковъ (особливо въ большихъ огородахъ) и главный ходъ устраиваютъ по срединѣ. Направление же грядъ въ длину, если мѣсто не ровное, то всегда должно быть обращено къ скату, чтобы при сильныхъ дождяхъ, вода протекала между грядами. Для правильной разбивки ихъ употребляютъ два способа или проѣзжаютъ сохою (съ присохомъ по срединѣ), лошадь у которой водить другой человекъ, или натягиваютъ веревку, и по ней, заступомъ, гдѣ быть грядамъ, проводятъ борозды (первый способъ ускоряетъ работу, а второй даетъ наибольшую прямизну). Ширину грядъ не слѣдуетъ дѣлать болѣе полутора аршина, чтобы ловче было полоть и поливать ихъ съ обѣихъ сторонъ. Вышину же грядъ надобно доводить до трехъ четвертей аршина и болѣе, если позволяетъ мягкость земли, которую непременно нужно зачищать, съ сдѣланныхъ бороздахъ, до самага плотуку (подпочвы).

О г о р а ж и в а н і е .

Огороживаніе огорода въ сѣверныхъ (достаточныхъ лѣсомъ) губерніяхъ, можно произво-

дить: во 1 хъ, обыкновенною изгородью изъ жердей, по преимуществу *косою* (извѣстною каждому крестьянину), чтобы скотина не могла перескакивать, и съ наблюдениемъ, чтобы колья, которые поддерживаютъ изгородь, были, если можно, „вересовые“, какъ медленно гнѣющіе, и вязка была бы „еловая“ не расплзающаяся отъ сухости; перекладки же между жердями „деревянныя“ (отнюдь не камни, которые гнетутъ жердье и портятъ вязки); во 2-хъ, полевымъ огородомъ, то есть, заборомъ изъ деревянныхъ столбовъ, со вложенными, въ вынутые у нихъ пазы, перекладинами. Столбы ставить чѣмъ толще, тѣмъ лучше, и концы ихъ закапываемые въ землю, обвиваются берестомъ или обжигаются, на полпальца въ толщину, чтобы не скоро гнили. Перекладины употребляютъ въ полтора вершка толщиной, на разстояніи другъ отъ друга полутора же вершка. (Этотъ заборъ очень проченъ; но требуетъ „дѣннаго“ строеваго матеріала, не вездѣ подручнаго) и въ 3-хъ, тонкими еловыми жердочками, въ перелетъ между тремя перекладинами, вложенными въ продолбленные въ столбахъ дыры (внизу ихъ, посрединѣ и вверху). При чемъ оставляются, безъ очистки, хвойныя верхушки у жердочекъ, которые не допускаютъ куриць садиться на изгородь и спускаться въ огородъ, гдѣ они сильно портятъ гряды. (Эта изгородь, по своей плотности, защищаетъ еще растеніе отъ вѣтровъ).

Устройство разсадника и парниковыхъ грядъ.

Въ каждомъ огородѣ надлежитъ быть: *разсаднику* и *парниковымъ грядамъ*. Первый рубится изъ бревень, продолговатымъ четырехугольникомъ, длиною — смотря по надобности; шириною — не болѣе двухъ аршинъ. Нижніе концы разсадника дѣлаются безъ притески (въ клѣтку), чтобы лучше продувало у него дно, которое выстилается отъ земли на разстояніи аршина и сверхъ этого дна, рубится еще столько вѣнцовъ, плотно другъ къ другу придѣланныхъ, чтобы они составили ящикъ, около 10 вершковъ глубиною. Въ него и накладываютъ: напередъ четыре вершка *свѣжаго* навоза; потомъ три вершка наилучшей просѣянной земли, а остальное мѣсто назначаютъ подъ ростъ растеній. Въмѣсто нижнихъ вѣнцовъ разсадника можно ставить столбы, и на нихъ утверждать описанный ящикъ. Для покрышки разсадника дѣлаются, по величинѣ его, изъ тонкихъ жердочекъ, рѣшетки, которыя, во время дня и полуденнаго жара, призатѣняютъ нѣжные стебли разсады, не допускаютъ птицу мять и вырывать ихъ; а ночью и при холодной погодѣ поддерживаютъ на себѣ прикрышку изъ рогожъ и соломенныхъ щитковъ. Для устройства же „парниковыхъ грядъ“ нужно вколотить въ землю 16 (и, пожалуй, и болѣе) тычекъ, по-

парно. и между ними вложить на ребро, доски, шириною въ 6 вершковъ, на которыя и кладутъ означенныя рѣшотки и прикрышки, также какъ и въ разсадникѣ. Навоза и парниковыя гряды помѣщаютъ на три вершка, а земли, самой сильной на два вершка. Въ нихъ сажаются тыквы и огурцы.

Хорошо растущія на сѣверѣ овощи и огородныя травы.

Необходимыя для крестьянъ, и благодарно, на открытомъ воздухѣ, въ сѣверныхъ губерніяхъ растущія овощи и огородныя травы, суть: *кочанная капуста* (ранняя — подъ названіемъ коломенской), *рѣпа* (простая, петровская), *морковь* (лучше красная), *редька*, *редисъ*, *свекла*, *брюква*, *картофель*, *крутій горохъ*, *русскіе бобы*, *лукъ чеснокъ*, *хренъ*, *огурцы*, *тыквы*, *укропъ* и *анисъ*.

Выгода и неудобство моченія сѣмянъ.

Сѣмена этихъ овощей и плодовъ (за исключеніемъ, разумѣется корневыхъ и луковичныхъ) можно садить моченыя, можно и сухія. Разница между ними будетъ та, что невыращенныя въ

водѣ взойдутъ послѣ; но за то онѣ при засухѣ, менѣе и повредятся. Моченія же сѣмена, по посадкѣ ихъ въ гряды или разсадникъ, если не содержать землю въ надлежащей сырости, — пока надежно не укоренятся растенія то ростки у нихъ засохнутъ.

Признаки всхожести сѣмянъ.

Вѣрно узнать, по одному наружному виду, всхожесть сѣмянъ затруднительно, — потому что многія изъ нихъ „кажутся“ очень хорошими; но, по разнымъ причинамъ, не никнутъ. Лучше всего имѣть сѣмена „свои собственныя“, дома выращенныя, или приобрѣтать ихъ отъ добросовѣстныхъ продавцевъ. Общіе же признаки всхожести сѣмянъ: у круглыхъ по виду — *полный наливъ* (то есть, ровность, не морщиноватость, тяжеловѣстность); у моркови — не затхлый, а собственный ея, морковный, запахъ и желтозеленый цвѣтъ. Рѣпчатый лукъ и чеснокъ — нѣкоторую сочность (не пересушенный видъ).

Сохраненіе сѣмянъ и сроки всхожести ихъ.

Сберегать сѣмена удобно въ амбарѣ, завернувши ихъ въ кушель, почеси или изгребни, въ ви-

сячемъ положеніи (чтобы не пострадали онѣ отъ мороза и мышей). Въ избѣ же гдѣ бываетъ попеременно, то очень тепло, то довольно холодно, равно какъ и въ сыромъ мѣстѣ, сѣмянъ не держать: для нихъ пригоденъ одинаковый, умѣренный воздухъ. При порядочномъ же сохраненіи сѣмянъ всхожесть ихъ продолжается:

Аниса — *два* года.

Сѣменнаго лука, чеснока, рѣпы, укропа — *три* года.

Рѣдиса, моркови — *четыре* года.

Капусты, брюквы, свеклы, рѣдьки, гороха огороднаго, бобовъ русскихъ — *пять* лѣтъ.

Тыквы, огурцовъ — *отъ шести до семи* лѣтъ.

Объ уходѣ за капустою и брюквою.

Для ускоренія всхожести сѣмянъ *капусты* и *брюквы*, слѣдуетъ — немедленно по стаяніи снѣга, — помочить ихъ въ обогрѣтой водѣ, и держать ихъ въ ней сутки, въ тепломъ мѣстѣ. Потомъ промыть ихъ *до чиста*, (чтобы сѣмя, отъ окислившейся воды, не испортилось) рассыпать на тряпку и положить ее на сырой мохъ, на блюдо. Другою же тряпкою прикрыть сѣмена, накласть на нее того же моху (пальца на два) и, поставя ихъ на прежнее мѣсто, гдѣ стояли, постоянно смачивать. И когда покажутся ростки, длиною

въ половину овсянаго зерна, тогда перенести всходы въ разсадникъ и засѣять ихъ тамъ не очень часто (или, какъ это любятъ дѣлать, выпрыскать ихъ изо рта). И за тѣмъ, засыпать сѣмѣна землею, чрезъ рѣшето, на столько, чтобы положенное на нихъ (бокомъ) яйцо, видно было вполонину. Послѣ чего, закрыть разсадникъ рѣшеткою, и поверхъ ея, рогожами, или, просто, крупною соломою (отъ мелкой засорится посѣвъ), которую и оставить до тѣхъ поръ, пока не взойдутъ ростки. Когда же они покажутся на верхъ, тогда, на дневное время покрывки снимать; а рѣшетку, для защиты отъ птицъ и затѣненія отъ сильнаго весенняго солнца, оставлять надъ растеніями *постоянно*. По ночамъ и въ холодную погоду рассаду держать закрытою. Поливать рано утромъ и *немного*, потому что отъ большой сырости она подгниваетъ. При такомъ уходѣ, рассада, недѣли въ три—четыре, подрастаетъ на три вершка и дѣлается готовою къ перенесенію на гряды. Тогда ее нужно сажать на нихъ, стебель отъ стебля на три четверти аршина, дѣлая ямки подъ корень палкою и оставляя лунку для поливки. Въ промежуткахъ помѣщать *брюквенную* рассаду, какъ не мѣшающую росту капусты (потому что она растетъ въ кочень, къ верху, а брюква въ корень, къ низу). Высадку надобно стараться принаравливать къ дождливой погодѣ, которая чаще всего бываетъ на наволуніе (когда невидно

мѣсяца) и въ первую его четверть (когда рожки обращены къ востоку). Въ сырую погоду почти каждый стебель принимается. А если подойдетъ уже засуха, то, по вечерамъ, рассаду поливать, и гдѣ она завяла, тамъ подсаживать новую. Черезъ три—четыре недѣли сорную траву между нею прополоть, и въ тоже время окучить стебли землею (то есть, пригрести ее нѣсколько къ корню). Когда же капуста пойдетъ въ клубки (вилки), тогда нижніе ея листы, равно какъ и сосѣдніе съ нею брюквенные, подламывать, чтобы дать просторъ росту кочнямъ; а корни брюквенные приокучивать, чтобы, отъ непокрытости ихъ землею, они не были деревянисты. Послѣ чего, капуста и брюква заботы уже никакой не требуютъ, кромѣ развѣ поливки ихъ въ засуху.

Уборка брюквы и капусты и запасы изъ нея.

Въ концѣ же сентября (между Пречистымъ и Покровомъ) нужно эти овощи убирать: брюкву выдернуть изъ земли, обрѣзать у ней ботву и убрать въ подвалъ (имѣющійся подъ избою у всякаго крестьянина) и тамъ засыпать ее, на полу, пескомъ. У тѣхъ же корней, которые отобраны на сѣмена, листы обрѣзать не плотно, оставя ихъ на полпальца. А капусту (тоже кро-

мѣ отобранныхъ на сѣмяна кочней) срѣзать съ корня и, смотря по надобности распорядиться съ нею слѣдующимъ образомъ: въ 1-хъ, если нужно сохранить ее для употребленія свѣжею, то, отломивъ отъ кочня самые крайніе синіе листья (плотно же прилегшіе къ клубку не трогать потому, что они будутъ защищать его отъ воздуха и „напередъ портиться“) вынести клубки въ подвалъ, связать ихъ попарно, мочалкою и перевѣсить ихъ на ней черезъ жердь, такъ, чтобы мыши не могли портить; для чего и привязать къ концамъ жерди пучки вересу или еловой хвои, которые помѣшаютъ этой твари всходить на нихъ. Можно еще сберечь свѣжіе кочни капусты между сухими смолистыми опилками, въ ящикахъ. Во 2-хъ, если нужно сдѣлать хорошую *квашеную капусту*, то понадобится уже побольше обломать синихъ листьевъ у кочней, чтобы оставить чисто-бѣлые клубки, изъ которыхъ вырѣзать и кочерыжки. Потомъ, бѣлые листья изрубить въ корытѣ или кадкѣ, сѣчкою, до-мелка; посыпать ихъ солью (на ведро полфунта) и анисомъ или тминомъ (горсть на ту же мѣру). И затѣмъ перетереть капусту между ладонями, чтобы она пустила сокъ, и уложить въ кадки. При чемъ можно и цѣлые клубки бѣлой капусты, надрѣзавъ средину ихъ крестъ на-крестъ и посыпавъ въ нее немного соли, укласть между рубленною капустою, по слойно. Съ кочерыжекъ же снять кожу, искрошить ихъ, положить въ

горшокъ, налить ихъ водою, поставить въ жаркую печь, уварить хорошенько, слить наваръ, простудить его и вылить на рубленную капусту, которую и поставить въ холодное мѣсто, наложивъ по верхъ ея деревянный кружокъ и гнетъ (камень). Назначаемую же для скорого употребленія держать въ теплѣ, чтобы она проворнѣе поспѣла (закисло). Послѣ чего и поставить на холодъ. Квашеную капусту лучше всего сохранять на погребѣ, не допуская ее до промерзанія, послѣ котораго она всегда дѣлается хуже. А передъ наступленіемъ весенняго тепла, чтобы она не переисхла и не промякла, нужно затискать въ нее свѣжій березовый колъ, который и оставить въ кадкѣ четыре недѣли; а потомъ замѣнить его новымъ. И такъ продолжать до израсходования всего запаса. Въ 3-хъ, если желаютъ имѣть капусту *пареную*, то для этого отбираютъ мелкіе и мягкіе клубки, укладываютъ ихъ плотно въ большіе горшки, закрываютъ капусту сѣрыми (наружными) листьями и ставятъ въ горячую печь, въ опрокинутомъ видѣ (то есть, дномъ въ верхъ). И когда капуста упарится, тогда перекадываютъ ее въ кадки и заливаютъ описаннымъ выше кочерыжнымъ наваромъ, напередъ посоленнымъ (но эту заготовку надобно *скорѣе* и держать, потому что она легко ослизаетъ и портится). Въ 4-хъ, *синіе листья* капусты идутъ на *кислицу* (здоровую пищу въ „будничныхъ“ шахъ крестьянина и отмѣнно любимую рогатымъ скотомъ),

которые для этого перемываютъ въ водѣ, складываютъ въ котель или большіе горшки, и кипятятъ до тѣхъ поръ, пока листья сдѣлаются мягки. Тогда убираютъ ихъ въ чаны, пересыпая каждый слой (вершка въ четыре) ржаной мукою, и, напоследокъ, по верхъ листьевъ, наливаютъ холодную воду, съ краями наровнѣ. Кислина не боится морозу; но лѣтомъ должна стоять въ холодномъ мѣстѣ. И въ 5-хъ, если желательно оставить капусту *на сѣмяна*, то надобно отобрать на грядахъ самые лучшіе кочни и выдернуть ихъ *съ корнями*, за которые по обломаніи синихъ листьевъ, и повѣсить на жердочки, въ томъ же подвалѣ, гдѣ назначено быть свѣжей капустѣ.

Уходъ за морковью и свеклою.

Чтобы выростить поскорѣе сѣмена *моркови* и *свеклы*, то для этого нужно положить ихъ въ мѣшочекъ (или, пожалуй, завязать узелкомъ въ тряпку) и, съ какимъ нибудь грузомъ—потому что онѣ легки—опустить въ воду; продержатъ ихъ въ ней часовъ съ пять (у поводъ); потомъ вынуть изъ нея и оставить въ теплѣ. На другой день перешевелить ихъ по нѣсколько разъ, чтобъ не слежался (особливо морковь, которую если садить и сухую, то нужно перетереть руками, для того, чтобы сбить у сѣмянъ ея усики,

сдѣпляющіеся другъ за друга и затрудняющіе посѣвъ). На третьи и четвертыя сутки показываются ростки, по появленіи которыхъ морковь сѣять на гряды, выбирая для этого тихую погоду (чтобъ равнѣ легли сѣмена), не очень часто, и засыпать ихъ землею сѣвозъ рѣшето, на полпальца толщиною; а свеклу садить, по сѣмячку, въ бороздки, на разстояніи одно отъ другаго на три вершка и глубиною на полвершка. Гряды должны быть *не навозныя* высокія и мягкія. Когда покажутся наружу всходы, тогда сорную траву прополоть, но осторожно, чтобы не выдернуть тоненькаго ростка моркови (похожаго на продолговатую траву). И если всходы, отъ неловкаго сѣянія, часты, то ихъ продергать. Послѣ чего, морковь и свекла, при поливкѣ, или умѣренныхъ дождяхъ, сильно идутъ въ ростъ и поспѣваютъ къ Успеневудню. Но убирать, ихъ съ грядъ и обрѣзать ботву нужно не ранѣе того, какъ зелень у нихъ состарѣется и отъ легкаго мороза, привянетъ: иначе онѣ скоро испортятся. Сохраняютъ эти вкусныя корни въ подвалахъ, засыпавши ихъ пескомъ; а у сѣмянныхъ оставляютъ ботвы на полпальца.

Уходъ за рѣпою.

Сѣмена *рѣпы* сѣются всегда сухія, на „давно удобренную землю“, не очень часто (чтобъ родилась крупнѣе), и забораниваются граблями. Потомъ всходы пропалываются и, гдѣ они часты—продергиваются. Этимъ кончается весь огородный уходъ за рѣпою. Но она *хорошо* родится еще на *наподстѣкахъ* (то есть, на мѣстѣ срубленнаго и выжженнаго лѣса), куда и высѣваютъ ее послѣ орьбы, подъ борону. Берегутъ рѣпу, если она въ маломъ количествѣ, то въ подвалахъ, а если въ большемъ, то въ земляныхъ ямахъ, поверхъ которыхъ кладутъ солому и насыпаютъ земли аршина на два, чтобъ не промерзла, также *сушатъ* еще слѣдующимъ способомъ: напередъ промываютъ рѣпу; потомъ укладываютъ ее въ большіе горшки, закрываютъ соломою, оборачиваютъ ихъ вверхъ дномъ и задвигаютъ въ горячую печь. Когда же она упарится, тогда крупную изъ нея разрѣзаютъ на куски, мелкую оставляютъ какъ есть, раскладываютъ ее, опять тонкимъ слоемъ, въ простывшую нѣсколько печь, на сплетенныя изъ лучины рѣшетки, и просушиваютъ ее уже „до твердости“. Въ такомъ видѣ рѣпа можетъ сохраниться „многіе годы“ и, распаренная въ водѣ, служить пріятную пищу, особливо въ приготовленіи кваса.

Уходъ за рѣдкойю и рѣдисомъ.

Сѣмена *рѣдки* и *рѣдиса* (то есть, ранней мелкой рѣдки) надобно мочить, по изготовленіи грядъ, два часа и садить ихъ потомъ, зерно отъ отъ зерна, первую на пять вершковъ, а послѣдній гораздо почаше; глубиною же на полвершка, не въ свѣжеудобренную землю. Послѣ этого понадобится ихъ прополоть и, гдѣ всходы часты, прорѣдить. Рѣдись поспѣваетъ чрезъ четыре недѣли, и его слѣдуетъ употреблять въ теченіе лѣта (отъ перероста онъ дѣлается дряблъ, червивъ и пустъ), а рѣдку убирать въ тоже время какъ и брюкву; также беречь ее и также запасать сѣмянные корни. Для рѣдки и рѣдиса особыхъ грядъ можно даже и не дѣлать; а садить ихъ *по бокамъ другихъ грядъ*; чрезъ это сберегутся земля и труды.

Посѣвъ сѣмянъ лука.

Сѣмена *лука* лучше сѣять на гряды послѣ Покрова, потому что онъ долго не всходитъ. Но если уже не успѣли сдѣлать этого осенью, то весною должно, поранѣе, мочить ихъ четверо сутокъ, каждый день перемѣняя воду, напередъ пріобогрѣтую. Затѣмъ положить ихъ въ тряпку и мохъ и смотрѣть, чтобъ сѣмена не заплеснѣвъли

(къ предупрежденію чего и прополаскивать ихъ, время отъ времени, вмѣстѣ съ тряпкою, до тѣхъ поръ, пока не покажутся ростки). Послѣ этого, разсѣять сѣмена на гряды, года за три тому назадъ унавоженные, слегка затрусить посѣвъ землею, изъ рѣшета, и когда онъ подрастетъ до длины средняго пальца на рукѣ, то пересадить стебельки на растояніи одного вершка (или, не дорожа ими, просто продергивать ихъ), въ вечернюю пору и утромъ, при недостаткѣ дождя, полить. Полотье произвести тогда, когда трава станетъ заглушать ростъ перьевъ. Послѣ Успеньева дня луковки нужно вынуть изъ земли, дать перьямъ ихъ завянуть; обрѣзать ихъ и бечевъ въ сухомъ тепломъ мѣстѣ (пожалуй на палаткахъ). Изъ этого лука, называемаго *саженецъ* или *песочнымъ*, на слѣдующій годъ, вырастаютъ большія луковки — рѣпчатый лукъ.

Уходъ за луковками саженица и рѣпчатого лука.

Посадка *луковокъ саженица и рѣпчатого* (крупнаго) *лука* производится около весенняго Николаина дня (когда достаточно нагрѣвается воздухъ и нельзя ожидать морозовъ) Луковки послѣдняго разрѣзаются на столько частей, на сколько найдется у нихъ ростковъ. Размѣщаютъ ихъ, равно какъ и луковки саженица, на грядѣ, не

чаще четырехъ вершковъ, углубляя ихъ до половины. Землю даютъ не сильную, а давно удобренную. И если желаютъ имѣть луковицы покрупнѣе, то перья у нихъ, по подростѣ на 10 вершковъ, мнутъ руками или лопатой (отнюдь не обрывая ихъ и не останавливая тѣмъ роста у луковицъ, которыя, отъ потери перьевъ, загниваютъ). Для употребленія же лука въ зеленомъ видѣ (травною) нужно брать его съ одной гряды, нарочно къ держанію уже и назначенной. Убираютъ и хранятъ рѣпчатый лукъ также, какъ и саженецъ.

Уходъ за чеснокомъ.

Чеснокъ садить съ осени въ холодныхъ странахъ не годится, потому что онъ и при укрыткѣ промерзаетъ. А лучше это сдѣлать весною, какъ только прочахнетъ земля, которая для него должна быть не навозная. Садить его надобно въ борозды, раздѣливши луковки на зубки, разстояніемъ одинъ отъ другого на четыре вершка, и въ глубину по самый ростокъ. Траву у него также, какъ и у лука принимать на обиходъ брать его съ одного мѣста; осенью луковки выдергивать, просушивать у нихъ траву, связывать ихъ въ пучки и держать тамъ, гдѣ сухо и не очень тепло.

Уходъ за хрѣномъ.

Для *хрѣна* особыхъ грядъ не надобно, по той причинѣ, что онъ на одномъ и томъ же мѣстѣ *лѣчебникъ-травникъ*.

скоро вырождается; его удобно разводить слѣдующимъ способомъ: нижніе концы корней хрѣна (самые тонкіе и почти негодные къ употребленію) осенью отрѣзать и разбросать ихъ по грядамъ, гдѣ они, при новой обработкѣ земли, хотя и перешевелятся, но все-таки взойдутъ весною достаточно, и къ осени обратятся въ хорошіе корни. Другого попеченія для хрѣна не нужно. Только надобно оберегать его (при впускѣ осенью, по собираніи овощей, скота въ огородъ) отъ свиней, „совершенно“ его истребляющихъ.

Огородный уходъ за картофелемъ.

Картофель въ добрыхъ хозяйствахъ растутъ въ парениномъ полѣ, въ загородѣ, оставляемый къ будущему году, подъ яровой хлѣбъ. Но если остается и въ огородѣ мѣсто подъ этотъ овощъ, то земля для него пригодна съ осени унавоженная. Къ посадкѣ выбирать средней величины картофелины, крупныя разрѣзать на глазки, а мелкія лучше совсѣмъ не употреблять на это дѣло (онѣ даютъ необильный урожай). Садить картофель слѣдуетъ поранѣе, какъ только оттаеетъ земля, и не чаще пяти-вершковаго разстоянія; потомъ, въ свое время, пропалывать и окучивать (пригрѣбать землю къ стволу растенія). Убираютъ картофель до наступленія сильныхъ морозовъ и берутъ его въ ямахъ или холодноватыхъ подвалахъ.

Роженіе сахарнаго гороха.

Подъ *сахарный горохъ* выбираютъ мѣсто, на которомъ онъ росъ лѣтъ пять или шесть назадъ, и при томъ давно (три—четыре года назадъ) унавоженное. (На тучной почвѣ горохъ идетъ болѣе въ траву, чѣмъ въ стручья). Передъ сажаніемъ онъ мочится въ водѣ до появленія ростковъ, и когда пустить ихъ, тогда садится на гряды въ бороздки, одну отъ другой на четыре вершка, глубиною на полувершка и въ разстояніи, горошина отъ горошины, на полтора вершка. По подростѣ его на ладонь, онъ пропалывается, и между ними ставятся колышки, около двухъ трехъ аршинъ вышиною, въ переплетъ, другъ за друга, крестами. Послѣ этого горохъ растетъ уже самъ собою и желтоватымъ цвѣтомъ своихъ стручьевъ показываетъ, что онъ поспѣлъ.

Уходъ за русскими бобами.

Русскіе бобы мочатъ столько, чтобы кожа у нихъ слегка поразмокла (если же держать ихъ въ водѣ до разбухлости, то отъ этого многіе изъ нихъ загниваютъ). Садить эти бобы слѣдуетъ поранѣе, какъ только позволить погода обработать гряды, *не въ сильную* землю, глубиною на вершокъ и въ разстояніи одинъ отъ другаго на три или четыре вершка. Когда всходы подрастутъ до полуаршина, тогда ихъ прополоть и поставить между ними, изрѣдка сосновыя лапинки, чтобы вѣтеръ не ломалъ стебли. А при началѣ

цвѣтенія, — обыкновенно снизу — верхушки у нихъ, для наибольшей завязи стручьевъ, оборвать на два вершка. Поспѣлость бобовъ легко узнается по темносинему цвѣту ихъ кожи и сухости стручьевъ. Бываютъ бобы съ бѣлою кожею: тогда твердость ихъ показываетъ тоже самое. — Для заготовленія бобовъ впрокъ, на кушанье, нужно ихъ вынуть изъ стручьевъ (чѣмъ моложе они будутъ, тѣмъ вкуснѣе), обварить ихъ въ кипяткѣ раздѣлить по половинкамъ и высушить.

Уходъ за огурцами.

Огуречные стмена, передъ посадкою, кладутъ въ воду на одни сутки. Потомъ ихъ раскладываютъ тонкимъ слоемъ, на ветошку, и поступаютъ съ ними также, какъ и съ мочениемъ сѣмянъ капусты. Когда же выдутъ ростки, тогда высаживать ихъ на *парниковыя ряды*, на разстояннн сѣмя отъ сѣмени, полуаршина, и глубиною на четверть вершка. На ночь и при холодной погодѣ всходы прикрываютъ досками, а сверхъ ихъ рогожами или соломенными щитками. Поливать огурцы надобно умѣренно (для избѣжанія пустоцвѣта). При сильномъ ростѣ, стебли ихъ расправлять, (каждый особо, чтобъ они другъ другу не мѣшали); а при сплошныхъ дождяхъ подкладывать подъ нихъ жердочки или прощипывать листья (чтобъ не подогнили). Для сѣмянъ оставляютъ на стебляхъ самые крупные плоды, до совершенной ихъ спѣлости (желтизны).

Послѣ чего ихъ срывають, держать въ теплѣ до тѣхъ поръ, пока они завянутъ и отмякнуть. Тогда вынимають изъ нихъ сѣмена, промываютъ ихъ нѣсколько разъ въ водѣ и просушиваютъ исподволь. На соленье же собираются огурцы не совсемъ спѣлые. При чемъ ихъ перемываютъ, укладываютъ въ кадки, отдѣляя каждый рядъ листьями черной смородины (а гдѣ есть, дубовыми яблочными) и укропомъ. Потомъ наливаютъ на огурцы разсолъ (изъ соли и воды), который долженъ быть приготовленъ *немного* солонѣе употребляемаго человекомъ въ пищу. Для сохраненія же „твердости“ въ нихъ прибавляется крошеный свѣжій хрѣнъ. А для удержанія „зеленаго цвѣта“ кладется на ведро разсола семь золотниковъ селитры. Посоленные огурцы хранятся въ холодномъ мѣстѣ, гдѣ не касался бы до нихъ морозъ.

Уходъ за тыквами.

Приготовленіе къ посадкѣ *тыквоз* и выращиваніе ихъ точно такое же, какъ въ предыдущей статьѣ у огурцовъ. Только первыя надобно стараться высаживать, если позволяетъ мѣстность, ближе къ ручью, рѣкѣ или озеру, потому что возлѣ воды тыквы растутъ лучше. Въ крестьянскомъ быту изъ плодовъ ихъ дѣлается довольно вкусная каша: для этого мясо ихъ мелко раскрывается, варится въ молокѣ и загущается прибавкою пшена или пшеничной муки.

Добываніе сѣмянъ изъ капусты и другихъ корней.

Выращиваніе сѣмянъ изъ сохраненныхъ, къ слѣдующему лѣту, *кочней капусты* и изъ корней: *брюквы свеклы, редьки и моркови* (о которыхъ не было говорено при описаніи ухода за ними), можно дѣлать на обыкновенныхъ грядкахъ. Для этого нужно посадить эти кочни и корни, при наступленіи теплыхъ дней, въ землю, такъ глубоко, какъ они росли въ первый годъ. Потомъ, во время засухи, поливать ихъ. А чтобы вѣтеръ не поломалъ выросшихъ стеблей, то главные изъ нихъ подвязать къ колышкамъ; для остальныхъ поставить заранѣе, по бокамъ, сухія сосновыя лапки, за которыя стебли и будутъ, при ростѣ, держаться. Когда же побурѣетъ на нихъ большая часть стручьевъ и сѣмянная брунь свеклы и моркови нѣсколько пожелтѣетъ, тогда, по мѣрѣ поспѣванія ихъ, срѣзывать это стебли, просушивать ихъ на вольномъ воздухѣ и обкалывать съ нихъ сѣмена. Но если грозитъ морозъ, послѣ котораго онѣ дѣлаются ненадежными, то лучше срѣзать ихъ и не совсѣмъ поспѣлыя: въ этомъ случаѣ, вызрѣвшіе, по крайней мѣрѣ „на вѣрное взойдутъ“.

Календарь сбора корней, коры, почекъ, листьевъ, цвѣтовъ, плодовъ и сѣмянъ.

Названіе растеній.	Часть растенія, употребляемая какъ лекарство.	Время сбора.
Малина лѣсн. красная, обыкновен.	Ягоды.	Іюнь и іюль.
”	Листья.	Май.
Обыкновен. вишня.	Плодъ.	Іюль и августъ.
Миндаль обыкновен.	Сѣмена.	По вызрѣваніи.
Лѣсная земляника.	Ягоды.	Май.
”	Листья.	”
”	Цвѣтъ.	”
Яблоня.	Плодъ.	Іюль и августъ.
Айва.	Плодъ.	Августъ.
”	Сѣмена.	Сентябрь.
Гранатовое дерево.	Кора.	Апрѣль.
”	Плодов. корка.	”
”	”	Августъ.
”	”	Апрѣль.
”	”	Августъ.
Анисъ.	Корень.	”
”	Сѣмена.	”
Укропъ обыкновенный.	Листья и стебель.	Май и іюнь.
”	Сѣмена.	Августъ.
Овесъ.	Зерна.	Августъ.
Рожь.	Зерна.	Августъ.

Названіе растеній.	Часть растенія, употребляемая какъ лекарство.	Время сбора.
Ячмень.	Зерна.	Августъ.
Пшеница.	Зерна.	Августъ.
Кукуруза.	Зерна.	Августъ.
Ленъ обыкновенный	Сѣмена.	Сентябрь.
Артишоки дикіе.	Листья.	Май.
Роза.	Лепестки.	Май и іюнь.
Конопля.	Сѣмена.	Августъ.
Каштанъ.	Цвѣты.	Іюль.
"	Плодь.	Августъ.
"	Кора.	Апрѣль.
Куриная трава.	Все растеніе.	Все лѣто.
Кипарисное дерево.	Плодь.	Зрѣлые.
Валерианъ.	Корень.	Апрѣль.
Папоротникъ.	Корень.	Май.
Хлопчатникъ.	Сѣмена.	Зрѣлыя.
"	Кора отъ корн.	Іюль.
"		
Бузина.	Цвѣты.	Май.
"	Ягоды.	Іюль.
Дягиль.	Корень.	Апрѣль.
"	Черешки.	Май.
"	Плоды.	Зрѣлые.
Буковица.	Цвѣты.	Май и іюнь.
"	Листья.	Май.
Болиголовъ.	Трава.	Іюнь.
"	Корень.	Май.
Звѣробой.	Листья.	Май.
"	Цвѣты.	Августъ.
Вязъ.	Кора.	Апрѣль.
Ревень обыкновен.	Корень.	Апрѣль.
"	Плоды.	Августъ.

Названіе растеній.	Часть растенія, употребляемая какъ лекарство.	Время сбора.
Горицвѣтъ весенній.	Трава.	Май.
"	Корень.	Апрѣль.
Морозникъ.	Корень.	Февраль.
Борець настоящій.	Листья.	Май.
Макъ снотворный.	Плоды.	Іюнь.
Чистецвѣтъ больш.	Трава.	Май и іюнь.
"		
"	Корень.	Апрѣль.
Дымянка аптечная.	Трава.	Май, іюнь и іюль.
Ложечная трава.	Трава.	Іюнь.
Хрѣнь.	Корень.	Іюль и августъ.
Рапсъ озимый.	Сѣмена.	Августъ.
Горчица черная.	Сѣмена.	Іюль и августъ.
" сарептская	Сѣмена.	Іюль и августъ.
Фіалка душистая.	Корень.	Май.
"	Цвѣты.	Іюнь.
Анютины глазки.	Корень.	Май.
"	Цвѣты.	Іюнь.
Истодъ горькій.	Все растеніе.	Все лѣто.
"	Корень.	Май.
Алтей аптечный.	Листья.	Іюнь.
Штокъ-роза.	Цвѣты.	Май и іюнь.
Просвирникъ лѣсн.	Цвѣты.	Май.
Лина мелколисті.	Цвѣты.	Май.
Рута пахучая.	Листья и все растеніе.	Май.
Крушина слабит.	Плодь.	Сентябрь и октябрь.
"		
Крушина ломкая.	Кора.	Апрѣль.
Виноградъ обыкновенный.	Плоды.	Іюль и августъ.

Название растеній.	Часть растенія, употребляемая как лѣкарство	Время сбора.
Стальникъ колючій.	Корень.	Сентябрь.
Донникъ лѣкарств.	Трава и цвѣтъ.	Іюнь.
Солодка гладкая.	Корень.	Сентябрь.
Римская ромашка.	Трава и цвѣтъ.	Май и іюнь.
Ромашка обыкновенная.	Трава и цвѣтъ.	Май и іюнь
Чернобыльникъ.	Трава.	Іюнь.
Полынь.	Трава.	Май.
Арника горная.	Корень.	Апрѣль и май.
Мать-мачиха.	Трава.	Май.
Волчець кудрявый.	Трава.	Май.
	Ягоды.	Зрѣлыя.
Цикорій обыкновен.	Корень.	Апрѣль и май.
	Листья.	Апрѣль и май.
Одуванч. аптечный.	Корень.	Апрѣль.
	Листья.	Май.
Клюква.	Ягоды.	Зрѣлыя.
Черника.	Ягоды.	Іюнь и іюль.
Толокнянка.	Листья.	Іюль.
Багульникъ.	Листья.	Іюнь.
Буковица бѣлая.	Цвѣты.	Іюнь.
Маслина.	Плодь.	Зрѣлый.
Золототысячникъ.	Трава.	Май и іюнь.
Перечавка.	Корень.	Апрѣль или октябрь.
Вахта.	Трава.	Май.
	Цвѣтъ.	Іюнь.
Ясень.	Сокъ.	Май.
Окопникъ лѣкарственный.	Корень.	Сентябрь.
Вязъ.	Кора.	Апрѣль.
Гравилаць городск.	Корень.	Августъ.

Название растеній.	Часть растенія, употребляемая как лѣкарство.	Время сбора.
Вязный или кровавой корень.	Корень.	Май.
Укропъ.	Сѣмена.	Августъ.
	Трава.	Май.
Болотная вшивица.	Трава.	Май.
Лѣкарств. вербена.	Трава.	Май, іюнь и іюль.
Переступень бѣлый.	Корень.	Сентябрь и октябрь.
Дубовыя ягоды.	Ягоды.	Августъ.
Чистотѣль почеч.	Корень.	Апрѣль.
	Трава.	Май и іюнь.
Кудрявая мята.	Трава.	Май.
	Цвѣтъ.	Іюнь.
Оскорь душистая.	Смола.	Лѣто.
Вероника лѣкарственная.	Трава.	Май и іюнь.
Бальзамовое дерево.	Бальзамъ.	Весной.
Бальзамъ западный.	Бальзамъ.	Май.
Мята лѣсная.	Трава.	Іюнь.
	Цвѣты.	Все лѣто.
Шалфей луговой.	Трава.	Май.
Робинія.	Цвѣты.	Май.
Дурманъ.	Трава.	Іюнь.
	Цвѣты.	Августъ.
	Плоды.	Августъ.
Тминъ.	Сѣмена.	Августъ,
Маслич. дерево.	Плоды.	Августъ и сентябрь.
Грецкій орѣхъ.	Плоды.	Іюнь.
Бѣлый девясиль.	Трава.	Май.
Кувшинчики бѣлые.	Корень.	Августъ.

Названіе растеній.	Часть растенія, употребляемая как лѣкарство.	Время сбора.
Дубъ.	Плоды и кора.	Осень.
Табакъ виргинскій.	Листья.	Май.
Александр. листь.	Листья.	Май.
Ботеръ, медунчикъ.	Цвѣты.	Май.
Ракушья шейка.	Корень.	Юль.
”	Вѣтки, ягоды и листья.	Все лѣто.
Божье дерево.	Сѣмен. и листья	Августъ.
Цейлонская трава.	Ягоды.	Май.
Агнець непорочный	Сѣмена.	Осень.
Арбузь.	Трава.	Все лѣто.
Репейникъ.	Трава.	Май.
Багунъ.	Корень.	Весна.
Безвремен. цвѣтъ.	Ягоды и кора.	Сентябрь.
Барбарисъ.	Цвѣты.	Осень.
Бедренець.	Плоды.	Августъ.
Турецкій бобъ.	Корни и листья	Все лѣто.
Борщевикъ обыкн.	Листья и ягоды	Юнь.
Вербейникъ бѣлый.	Цвѣты и сѣмена	Все лѣто.
Голубки.	Плоды.	Осень.
Гречиха.	Ягоды.	Юль.
Грыжовникъ.	Все растеніе.	Осень.
Дождевикъ.	Сѣмена.	Августъ.
Англійская горчица.	Сѣмена.	Юль.
Конжуть.	Цвѣты.	Юль.
Лаванда.	Листья и сѣмен.	Осень.
Черная бѣлена.		
Песы вишни, сонная одурь, белад.	Все растеніе.	Все лѣто.
Лица.	Цвѣты.	Юнь.
Морковь.	Корень.	Августъ.
Ананасъ.	Плодъ.	Зрѣлый.
Араруть.	Корень.	Августъ.

Названіе растеній.	Часть растенія, употребляемая как лѣкарство.	Время сбора.
Аройникъ.	Плодъ.	Сентябрь.
Асса-фетиеда.	Смола.	Весной.
Эстрагонъ.	Трава.	Юль.
Кресъ.	Трава.	Апрѣль и май.
Водяной.	Трава.	Юнь.
Дубровка.	Надземныя части.	Все лѣто.
Пирамидная.	Трава.	Юль.
Луговой вѣтрянн.	Трава.	Все лѣто.
Хвоць обыкновенн.	Все растеніе.	Все лѣто.
Хвоць иловатый.	Корень.	Май.
Рѣчной хвоць.	Корень.	Сентябрь.
Орѣшистая дымница	Все растеніе.	Все лѣто.
Вѣтвист. чистоутъ.		
”		
Сѣверн. расщельн.	Трава.	Май.
Рѣдковолоосый селезеночникъ.	Трава.	Юнь.
Горохъ обыкновенн.	Стручки.	Юль.
Завязникъ стоячій.	Корень.	Сентябрь.
Мелиха.	Трава.	Май и юнь.
Базиликъ.	Трава.	Май.
Бальзамъ.		
Миррскій.	Смола.	Весной.
Калина.	Ягоды.	Августъ.
Калуферъ.	Сѣмя.	Сентябрь.
Барвинокъ.	Все растеніе.	Все лѣто.
Каперсовый кустъ.	Плоды.	Августъ.
”	Трава.	Май.
Капуста.	Листья.	Юнь и августъ.
Пьянишникъ.	Листья.	Юнь.
Бересклетъ.	Плоды.	Сентябрь.
Колосъ благовонн.	Цвѣты.	Юль.

Названіе растеній.	Часть растенія, употре- бляемая какъ лѣ- карство.	Время сбора.
Кервель.	Все растеніе.	Іюнь.
Кленъ.	Сокъ.	Весной.
Обыкновен. блошниц.	Трава.	Май.
Богородская трава.	Все растеніе.	Іюнь.
Самосѣйка макъ.	Сѣмя.	Августъ.
Хрѣнь.	Корень.	Сентябрь.
Бузина красная.	Цвѣты.	Іюль.
Ваниль.	Стебель.	Іюнь.
Карказонъ.	Корень.	Сентябрь.
Казацк. можжевел.	Ягоды.	Августъ.
Кошачья мята.	Трава.	Май.
Большая крапива.	Трава.	Іюнь.
Петрушка.	Трава.	Іюнь.
”	Корень.	Августъ.
Настурція.	Трава.	Май.
”	Цвѣты.	Іюнь и іюль.
Желтый левкой.	Все растеніе.	Все лѣто.
Львиная пасть.	Трава.	Іюнь.
Кукушкинъ ленъ.	Трава.	Май.
Лилія бѣлая.	Луковицы.	Августъ.
Громовой бобъ.	Корень.	Августъ.
”	Листья.	Май.
Чеснокъ.	Луковица.	Августъ.
Желтый василистн.	Корень.	Сентябрь.
Верескъ.	Трава.	Май.
Вьющаяся жимол.	Трава.	Іюнь.
Жимолость обыкн.	Кора.	Апрѣль.
Клубненосн. запн.	Трава.	Май.
Звѣздочатка больш.	Трава.	Все лѣто.
Зимовникъ осенній.	Корни.	Осень.
Капуста заячья.	Корни, трава.	Іюль.
Золотая розга.	Трава.	Все лѣто.

Названіе растеній.	Часть растенія упо- требляемая какъ лѣ- карство.	Время сбора.
Зольникъ калинный.	Цвѣты.	Августъ.
Зоря садовая.	Корни.	Все лѣто.
Зюзникъ европейск.	Листья.	Весна.
Водяная сосенка или хвощъ.	Трава.	Май.
Водяная звѣздочка.	Трава.	Май.
Лиственница.	Листья.	Все лѣто.
Вехъ ядовитый.	Листья.	Августъ.
Виноградъ дикій.	Плоды.	Августъ.
Вороній глазъ.	Листья.	Все лѣто.
Ольха.	Кора.	Осень.
Жидовскія ягоды.	Ягоды.	Августъ.
Колесчатое просо.	Сѣмена.	Осень.
Боръ разсыпной.	Сѣмена.	Іюль.
Каріондеръ.	Плоды.	Августъ.
Плевель пьяный.	Сѣмена.	Осень.
Лавровишневое дер.	Листья.	Все лѣто.
Сокольн. померанц.	Все растеніе.	Іюнь.
Полевая березка.	Корень и трава	Весна.
Лютичная вѣтрен.	Листья.	Май.
Гваяковое дерево.	Кора.	Все лѣто.
Красная смородина.	Ягоды.	Іюль.
Черная смородина.	Ягоды.	Іюль.
Лукъ обыкновенн.	Корень.	Все лѣто.
Гнѣздовка обыкнов.	Корень.	Іюль.
Земноводн. гречиха.	Корень.	Все лѣто.
Пахучая смолка или ясменникъ.	Трава	Май.
Благовонный рѣпн.	Все растеніе.	Все лѣто.
Болотн. серебрякъ,	Трава.	Іюнь.
Аминное дерево.	Смола.	Лѣто.
Цытварная польнь.	Сѣмена.	Августъ.
Лѣчебникъ-травникъ.		

Названіе растеній.	Часть растеній употребляемая какъ лѣкарство.	Время сбора.
Марена.	Корень.	Іюль.
Грудничникъ.	Плоды.	Осень.
Груша.	Плоды.	Августъ.
Круглолиств. груш.	Листья.	Май.
Ива бѣлая.	Листья.	Все лѣто.
Ива ломкая.	Листья.	Все лѣто.
Иванъ да Марья.	Листья.	Май.
Иванъ чай.	Листья.	Все лѣто.
Икотникъ сѣро-зеленый.	Трава.	Іюнь.
Ипекакуана настоящая.	Корень.	Лѣтомъ.
Иссопъ лѣкарственный.	Листья.	Іюнь.
Истодъ обыкновенный.	Корни.	Все лѣто.
Норичникъ узлокоренной.	Корень.	Все лѣто.
Полевая ярушка.	Сѣмена.	Осень.
Морошка.	Ягоды.	Августъ.
Адамова голова.	Корень.	Все лѣто.
Орѣшникъ индѣйск.	Плоды.	Августъ.
Гусиная лапа.	Корень.	Все лѣто.
Девясиль.	Корень.	Все лѣто.
Подсолнечникъ.		
Деревей.	Трава.	Іюнь.
Дивала однолѣтняя.	Трава.	Май.
Дрокъ красильный.	Сѣмя.	Августъ.
Водяной мохъ.	Все растеніе.	Іюль.
Пуховникъ,	Трава.	Іюнь.
Куколь.	Сѣмена.	Августъ.
Кадило пахучее.	Трава.	Іюнь.

Названіе растеній.	Часть растенія употребляемая какъ лѣкарство.	Время сбора.
Какао.	Бобы.	Зрѣлые.
Камфорное дерево.	Смола.	Весной.
Карагень.	Все растеніе.	Все лѣто.
Кардамонъ.	Сѣмена.	Августъ.
Кардобенедиктъ.	Все растеніе.	Все лѣто.
Картофель.	Придатокъ	
Касатикъ нѣмецкій.	корня.	Сентябрь.
	Трава.	Май.
Касатикъ сибирскій	Корень.	Августъ.
Касатикъ флорентійскій.	Корень.	Сентябрь.
	Корень.	Осень.

К о н е ц ъ .

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Предисловіе	Стр. 3
-----------------------	--------

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

О сборѣ, приготовленіи, сохраненіи и употребленіи лѣкарственныхъ растений	7
Корни растений	8
Травы и листья	9
Цвѣты	11
Сѣмена и плоды	—
Корки дерева и шишки	12
Сравнительный медицинскій вѣсъ и мѣра	13

*Описаніе црѣлебныхъ отечественныхъ растений, рас-
положенныхъ въ алфавитномъ порядкѣ.*

А.

Авранъ или лихорадочная трава, благодать	15
Анисъ, ганусъ	16
Аиръ или ирь, сабельникъ, касатикъ	—
Арбузь	17
Артишокъ	—

Б.

Багунъ, багульникъ, клоповникъ	—
Баранья трава	—

II.

Барвинокъ, гробная трава, малая могильница	Стр. 18
Батеръ, медуничникъ, бѣлоголовець, шламда, ла- базникъ, раповникъ, дикая рябина	—
Береза	—
Божье дерево	19
Болиголовъ, омегъ, головоломъ, мутникъ, вонючка, дегтярка	—
Брусника	20
Бузина черная, деревянная, боръ дерево	—
Буковица черная, гасникъ	21
Бѣлена черная, блекота	—
Бѣлена бѣлая	22
Бѣлокопытникъ, мать и мачиха, матерникъ, подбѣль, двоелистникъ	—

В.

Василекъ, лоскутница ржаная	—
Василистникъ, золотуха желтая, записка, луговая рута, золотень, живительная трава, матренка	—
Верба бѣлая, или ветла, пяти мужная, или черный тальникъ, ломкая, или ива хрупкая	23
Вероника аптечная	—
Вероника ручейная или ибунка, козій ростъ, козья морда, цинготная трава, поточникъ	—
Виноградъ	24
Водоленъ сухой, копытень или подлѣсникъ, подорѣш- никъ, облапа, обхватка, скацидарникъ	—
Вологлотка, дубравка пирамидная, живучая трава, синяя горлянка, одногубка	—
Волчье лыко, волчій перецъ, дикій перецъ, лаврикъ волчій, шелковое лыко, волчая ягода	25
Волчій корень, борець, проградъ, прострѣль, при- крышь, волкобой	—
Волчець кудрявый, стоголовникъ, осоть, чертополохъ	26
Вороній глазъ, воронецъ, одноягодникъ	27
Вязъ	—

III.

Стр.

Г.

Глазница аптечная, очная помощь, очная трава, свѣтликъ	28
Глухая крапива, яснотка бѣлая, пчелососка	—
Горохъ	29
Горчица-черная	—
Гребенникъ, чагирскій чай, чистецъ, мунгальскій чай	—
Губка	30
Губка вербная	—
Гулявникъ, жеруха струйчатая, мудрость лѣкарская	31

Д.

Двузубецъ, череда, козы рожки, собачки, коноплянка	—
Девясиль, умань	—
Дрокъ, шильная трава	32
Дубровки, очанка, ростроть	—
Дубъ	—
Дурманъ, дурнишникъ большой	33
Душица садовая	34
Дягиль, коровникъ, дягиль лѣсной, медвѣжьи пучки	—
Дымянка, земляной дымъ, чистякъ, полевая рута кокорышь, дымница. земляные орѣшки, дымница орѣшистая, луковичная	—
Дыня	35
Дѣтская трава, кукушкины слезки, салепъ, бѣлый сатиръ, дремликъ, царикъ, царь	—

Е.

Ежевика или ожина, дереза, куманика	—
Ель	36

Ж.

Жабникъ вредный, болотный, пѣтушья нога, жабог- ненный, прыщенецъ, купальница, жаб. остросоч-	
--	--

IV.

Стр.

ный, ѣдкій лютикъ, жаб. полевой, куриная слѣ- пота, жабинецъ	—
Жабникъ чистотѣльный, лютикъ почечуйный, чистякъ меньшой	37
Жабникъ, могущикъ гусиный, гусиная пажить, се- ребренникъ, молка	38
Жеруха огородная, кресь садовый	—
Живучка кровельная, молодиль большой, дикій че- снокъ, очистокъ, дикіе артишоки	—
Жигунецъ, стелющійся ломоносъ, бородавочница	39
Журавики, журавлина, клюква	—

З.

Завязникъ стоячій, узикъ	40
Заячья капуста, молодиль сайгачій, толстолистная капуста, скрипунъ	—
Заячій щавель, кислица	41
Звѣробой	—
Земляника, земляница, сунца, полуница	—
Змѣй, трава, клещеница, образки горные, сухотный корень, ааронова борода	42
Змѣвникъ двудомный, кошачьи лапки	43
Золотень, золотушникъ, золотая розга	—
Зоря	44

И.

Ивановъ цвѣтъ, златоцвѣтъ, стоцвѣтъ, воловьѣ око бѣлица, водоглазь	45
Истодь	—

К.

Калина	46
Калужница, курослѣпъ болотный	—
Камчадалка одуванчикъ, попово гуменцо, кульбаба, хасанъ, цикорій дикій, попова скуфья, плѣшивецъ	—
Капуста огородная или кочанная	47

Касатикъ болотный, сабельникъ	—
Кашка тысячелистникъ, гулявица, пижма, душистая греча, рябинка, деревей, кровавикъ, растиральникъ, чахотная трава	48
Каштанъ дикій или конскій	—
Кислица	49
Кишинець, коляндра	—
Кленъ, некленъ, палень	—
Колокольчики оксамить, орлики голубки или павлиныя очки; водосборъ	—
Колосница мѣстная, лѣсная буквица, змѣиная трава, змѣевникъ	50
Колосница готовая	—
Корень ластовочный, стручечникъ, чертова борода, чортово зелье	51
Крапива большая	—
Крапива жигучка	—
Крапъ, марена	—
Красавица, сонная одурь, песьи вишни, вѣтряныя ягоды	52
Кротовикъ, дубра ползучая, плющикъ, душистыя кудри	53
Кувшинка бѣлая, водяныя маковки, лататы, кувшинка желтая, кубышечки, водяной лягушникъ	—
Курслѣпъ малый очной цвѣтъ, умъ да разумъ	54
Курятникъ вонючій, ладанъ лѣсной	—

Л.

Лавруша, волчникъ	55
Лавровишня	—
Ландышъ майскій, л. многоколѣнчатый, соломонова печать, купена	56
Лебеда садовая	—
Ленъ	57
Лица	58
Лукъ	—

Лягушечный песокъ нитчатка ручейная, тина рѣчная, водяной мохъ	59
Лягушникъ, репейникъ	—

М.

Майоронъ кошачій, кошачья трава	60
Макъ бѣлый садовый, макъ бѣгунъ	—
Макъ красный	61
Малина	—
Марь. Ея видъ	—
Маточникъ, медовка потогонная трава	62
Медвѣжье ушко, царскій скипетръ, царская свѣча, коровьякъ, вербишникъ бѣлый	—
Медуница аптечная, пятнистая	63
Можжевельникъ обыкновенный, яловець	—
Молочай болотный	—
Молочай площевый или круглолистный, м. ѣдкій, придорожный солнечный	64
Морковь огородная и лѣсная	—
Мотодиль, молодиль, остросочный, перецъ дикій	65
Мохъ исландскій или грудной, его сурогаты, лишай печеночный, лишай вшивый, собачій мохъ, мохъ оленій	66
Мохъ земляной, лишай собачій	—
Мухоморъ	67
Мята	68
Мята кудрявая	—

Н.

Наперсточная трава	69
Нардъ, увѣчная трава	70

О.

Овесъ	71
Огурецъ	—
Ольха	—

VII.

Стр.

Орлякъ, папортникъ женскій, папортникъ водяной, сказанякъ	72
Орѣшникъ грецкій	—
Осина, іудино дерево	73
Осока песочная, нѣмецкая сарсапарель	74
Осокорь черная и тополь бѣлая	—
Осокорь душистая, тагамагокъ, рай дерева	75
Осоть, заячья капуста	—

II.

Павунъ, бобровица, вахта, стрѣла	76
Папортникъ мужской, разрывъ-трава	—
Повой воинскій, благовонный, ноготки	77
Полынь	—
Пасконъ дикая, водяная конопля, конская грива	78

P.

Ревень	—
Рѣжуха, жеруха, крестъ водяной	79
Рѣпникъ обыкновенный	—

C.

Сальникъ, жидкость	80
Свиной хвостъ, хвовая трава, желтолень	—
Сердечникъ, сердечная трава, львиноустъ сердечный, гусяная лапа, львиный хвостъ, дикая крапива	—
Сіумъ водяной	—
Сладкогорькое, сорочья ягода	81
Смородина черная	—
Собачья морда, чернокудренникъ волосистый	—
Сокольникъ волосатый, ноготная трава, мышь и ушки	—
Соколий перелетъ, крестовая стародубка	82
Солодка жесткая, колючая	—
Спорынья	—

VIII.

Стр.

T.

Табакъ	83
Тыква горькая, чертовы яблоки	—

Ф.

Фіалка душистая	84
Фіалка собачья	—

X.

Хмѣль	—
Христофорова трава, воронецъ	—
Хрѣнь	—

Ц.

Цинготная трава, варуха, морской салатъ, ложечная трава	85
---	----

Ч.

Чемерица черная	86
Чернобыльникъ	—
Чешуйчатый корень, петровъ крестъ	87
Колдунья	—

III.

Шалфей	—
Шафранъ	—
Шиковникъ кирказонъ или кокорникъ, смольникъ	88

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

A.

Армудъ, квитъ, гуни, айва, пигва	89
Аистникъ вонючій	—
Алебастренникъ стѣнной	90

Ампрыкъ, толокнянка медвѣжья, медвѣжий виноградъ,
медвѣжьби ягоды толокнянка стелющаяся . . . —

Б.

Базиликъ —
Барбарисъ 91
Бедренець каменистый —
Бирючина —
Болдырьянь дикій, маунъ земляной ладанъ, очной
корень 92
Бѣшеница водяная, мутникъ, омегъ —

В.

Вербейникъ 93
Вербейникъ полушечный, полушечная трава луго-
вой чай, денежникъ —
Верескъ обыкновенный —
Верескъ восковой ягодный, пахучка сухоягодная . 94
Волконогъ, водяная шандра, волчья лапа —
Воловикъ аптечный, воловій языкъ, цареградскій
красный корень —
Воробейникъ аптечный —
Вьюнокъ заборный, повилычнй колокольчикъ, об-
вивальня заборная 95
Вѣтряница лѣсная, лѣсной одномѣсячникъ —
Вѣтряница печеночная, завитки, трилистникъ чистый.
Вѣтряница прострѣльная, сонъ трава 96

Г.

Горчанка желтая —
Гравилать береговой 97
Грушовка круглолистная, дикая грушица —

Д.

Деятилѣтникъ дикій, десятильникъ, пижма —
Дубровка трилистная, кадило, паклунъ, параличная
твава 98

Дубровка, майоранъ лошадиный, конскій чеснокъ . . . —
Дубровыя ягодки, омела, птичій клей 99

З.

Завалець, норычникъ, собачья голова, красный ко-
рень, зобный корень, старовина —
Змѣеголовникъ молдавскій, турецкая мелисса . . 100
Золототысячникъ, золотникова трава —

К.

Калуферъ 101
Камфарница —
Кервель —
Козелець дикій, ужовникъ, косматикъ 102
Козлобородникъ, чертова борода —
Коперь —
Кошечья трава, кошечья мята 103
Кресъ луговой, полевой сердечникъ, полевая гор-
чица, смолянка —
Крестовникъ дикій, старина —
Кринь, лилія бѣлая 104

М.

Мандрагоръ мужской корень, Адамова голова, сон-
ное зелье —
Маргаритка, бѣлая скороспѣлка, бѣльцы, стоцвѣтъ. 105
Материнка, душица обыкновенная, микоранъ —
Морошка, мамура 106
Мыльнянка, мыльная трава —

П.

Песій гроздь, жимолость благовонная 107
Просвирки 108

Р.

Размаринъ —
Росьянка круглолистная —

XI.

Стр.

С.

Стручечникъ 109

Т.

Таволга питковинная, трясушка —

Тминъ —

Тростникъ —

Троичный цвѣтъ, веселые глазки, анютины глазки. —

Ч.

Чечина трава горець водоперечный, водяной перецъ,
почечуйникъ, собачій перецъ 110

Чистотѣль —

Чумный корень, бѣлокопытникъ чумный, девясиль-
ный лопутникъ —

Ш.

Шлемовникъ, щитовникъ 111

Я.

Яблоня —

*Приготовленіе полезныхъ для здоровья блюдъ, изъ
зелени и овощей.*

Объ употребленіи зелени 112

Брюква 113

Свекла —

Зеленые бобы или фасоль 114

Турецкіе бобы 115

Бѣлые бобы съ помидорами 116

Зеленый горохъ по-французски —

Зеленый горошекъ, сушеный —

Горохъ сахарный въ стручкахъ 117

Рѣпа и кольраби —

Грибы тушоные въ сметанѣ 118

Грибы сушоные въ родѣ свѣжихъ 119

Каштаны жареные въ маслѣ —

XII.

Стр.

Браунколь съ каштанами 120

Цвѣтная капуста 121

Артишоки 122

Капуста сафой —

Капуста свѣжая, приготовленная какъ кислая 123

Тушоная красная капуста 124

Кислая капуста 125

Кислая постная капуста —

Свѣжая капуста съ яблоками 126

Брюссельская капуста —

Капуста фаршированная 127

Листья капусты фаршированныя —

Картофель 128

Картофель молодой вареный безъ воды 129

Жареный картофель —

Картофель со сметаною 130

Картофель —

Картофель „à la lyonnaise“ 131

Картофель съ грибами —

Картофель начиненный грибами 132

Пышки изъ картофеля —

Картофель съ селедкой 133

Ригее изъ картофеля 134

Картофель по-французски —

Морковь —

Рыжики въ маслѣ 136

Спаржа 137

Спаржа зеленая, приготовленная въ родѣ зеленого

горошка 138

Шпинатъ —

Пудингъ изъ шпината 139

Шавель 140

Крапива или лебеда —

Пирожки изъ зелени 141

Уходъ за огородными овощами —

Потребность огородныхъ овощей 142

Средства къ содержанію огорода	—
Выборъ мѣста	—
Поправленіе почвы	143
Очередь удобренія и величина огорода	144
Время вывоза навоза	—
Обработка огорода	145
Разбивка грядъ	146
Огораживаніе	—
Устройство разсадника и парниковыхъ грядъ	148
Хорошо растущія на сѣверѣ овощи и огородныя травы	149
Выгода и неудобство моченія сѣмянъ	—
Признаки всхожденія сѣмянъ	150
Сохраненіе сѣмянъ и сроки всхожести ихъ	—
Объ уходѣ за капустою и брюквою	151
Уборка брюквы и капусты и запасы изъ нея	153
Уходъ за морковью и свеклою	156
Уходъ за рѣпою	158
Уходъ за рѣдкою и рѣдисомъ	159
Посѣвъ сѣмянъ лука	—
Уходъ за луковицами саженца и рѣпчатого лука	160
Уходъ за чеснокомъ	161
Уходъ за хрѣномъ	—
Огородный уходъ за картофелемъ	162
Рощеніе сахарнаго гороха	163
Уходъ за русскими бобами	—
Уходъ за огурцами	164
Уходъ за тыквами	165
Добываніе сѣмянъ изъ капусты и другихъ корней	166

ДВА НОВѢЙШИХЪ ВНОВЬ СОСТАВЛЕННЫХЪ
Самоучителя
АНГЛІЙСКАГО и ИТАЛЬЯНСКАГО
ЯЗЫКОВЪ.

(Каждый самоучитель продается отдѣльно).

Практическое руководство безъ всякой помощи учителя и въ самое короткое время научиться **ВПОЛНѢ ХОРОШО** и **БЪГЛО** читать, писать, переводить и говорить по-**АНГЛІЙСКИ** и **ИТАЛЬЯНСКИ**. Практическая грамматика, упражненія, статьи для чтенія и переводовъ, хрестоматія и словарь съ приложеніемъ **ПРОПИСЕЙ**. Обработано для русскихъ по **Henri Wild, Polyglotte Kuntze** и друг. лекторомъ Англійскаго и Итальянскаго языка спеціальнаго коммерческаго училища **Мар. Фридрихсонъ**. Въ каждомъ руководствѣ два большихъ тома убористой, но четкой печати около 500 стран.
Цѣна 2 руб., въ хорошемъ колѣнн. съ золот. тисн. перемл. 3 руб. За оба руководства 4 руб., а въ хорошемъ переплетѣ 6 руб.

Отдѣль окончателнаго изученія и практическихъ занятій въ иностранныхъ языкахъ дополненъ мною въ текущемъ году только что отпечатанными и поступившими въ продажу новыми небывалыми до сихъ поръ въ Россіи самыми полными изданіями, составленными по *Курсе* и друг. компет. источникамъ.

Томъ I. РУССКО-ФРАНЦУЗСКО-НѢМЕЦКІЕ

общественные разговоры и объясненія. Въ 3-хъ частяхъ. Составили преподаватели французскаго и нѣмецкаго языковъ **А. Мозеръ** и **В. Готманъ**. Руководство для русскихъ и иностранцевъ. Съ приложеніемъ обширнаго словаря, пословицъ и изреченій. Такимъ образомъ это изданіе, помимо своего прямого назначенія, можетъ служить и дорогіе словари. Цѣна 2 р., въ хорош. колѣнн. пер. 3 р.

Томъ II. АНГЛІЙСКО-РУССКІЕ

общественные разговоры и объясненія. Составилъ **М. Фридрихсонъ**, лекторъ англійскаго языка въ спеціально-коммерческой школѣ. Руководство для русскихъ. Цѣна 1 руб., въ хорошемъ колѣнн. переплетѣ 1 руб. 50 коп.

Томъ III. ИТАЛЬЯНСКО-РУССКІЕ

общественные разговоры и объясненія. Составилъ **М. Фридрихсонъ**, лекторъ итальянскаго языка. Руководство для русскихъ. Цѣна 1 руб., въ хорошемъ колѣнн. переплетѣ 1 руб. 50 коп.

Гр. иногородніе, выписывающіе одновременно всѣ выѣсть 7 книгъ, т.-е. Самоучители французскій, нѣмецкій, англійскій, итальянскій и книги Русско-французско-нѣмецкіе, англійско-русскіе и итальянско-русскіе разговоры безъ переплета платятъ за нихъ выѣсто 11 р. только 10 р., а въ переплетахъ выѣсто 16 р. 15 р.

НОВАЯ КНИГА ДЛЯ ВЛАДѢЛЬЦЕВЪ ПАРОВЫХЪ МАШИИЪ:

(Въ хвалыные отзывы объ этой полезн. книги были напеч. во многихъ газет. и техн. журн.).

ИНДИКАТОРЪ

и его употребленіе. Практическое руководство къ употребленію Индикатора для техниковъ, механиковъ, заводчиковъ, фабрикант. и вообще для владѣльц. паровыхъ машинъ

Составилъ инженеръ **У. ЭСМАРЪ**. Съ 56 политик. въ текстѣ.

ПОЛНАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ШКОЛА
ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОВЪДѢЛІЯ. новѣйшій научно-практическій курсъ
КУЛЬТУРЫ ВІНОГРАДА.

Общепонятное руководство разведенія, воспитанія и ухода за виноградной лозой, болѣзни винограда, ихъ предупрежденіе, лѣченіе и мѣры борьбы съ ними. Подробный толковый самоучитель и полная школа Винодѣлія и погребного хозяйства. Рациональные способы фабрикаціи, улучшенія, сохраненія, сортировка, розлива, выдержки и пробы всѣхъ сортовъ винъ, какъ русскихъ, такъ в заграничныхъ, съ изложеніемъ наиболѣе вѣрныхъ и надежныхъ приемовъ распознаванія и обнаруженія фальсификаціи и поддѣлки виноградныхъ винъ и съ прибавленіемъ обширнаго Сборника рецептовъ, изготовленія искусственныхъ виноградныхъ винъ, а также фруктовыхъ и ягодныхъ. Необходимая настольная книга для винодѣльцовъ, виноградарей, садоводовъ, винооторговцевъ, складчиковъ, погребщиковъ, киперовъ, рестораторовъ, буфетчиковъ, потребителей и т. п. Соч. ПЮВИ, дополнилъ по новѣйшимъ источникамъ русской и иностранной винолוגіи винодѣль практикъ Э. ДЮПРЕ. Въ 3-хъ частяхъ. Со многими рисунками въ текстѣ. Издан. 3-е. Ц. 1 р. въ хороѣ. коленк. пер. 1 р. 50 к.

ПРИГОТОВЛЕНІЕ ДРОЖЖЕЙ. жидкихъ и сухихъ, прессованныхъ домашнихъ способомъ. Составилъ В. Юзвиневиць. Цѣна 25 коп., въ переплетѣ 75 коп.

УДОБРЕНІЕ полей, луговъ, огородовъ, виноградниковъ, газоновъ, садовъ и цвѣтниковъ. 1) Дешевыя, испытанныя и скородѣйствующія удобрения: фосфоритная мука и известь. 2) Искусственные туки: въ плодовыхъ садахъ, огородахъ, цвѣтникахъ для газоновъ и виноградникахъ. Необходимое руководство для землевладѣльцевъ, сельскихъ хозяевъ, садовниковъ, огородниковъ и друг. Составилъ по самымъ послѣднимъ и новѣйшимъ источникамъ агрономъ Н. Д. Дмитріевъ. 200 стр. Цѣна 1 руб., въ хороѣ переплетѣ 1 руб. 50 коп.

ОРОШЕНІЕ полей, огородовъ, садовъ, виноградниковъ и сѣнокосныхъ угодій. Различныя системы пользованія водою, нужною при производствѣ оросительныхъ работъ въ большихъ и малыхъ размѣрахъ. Машины, снаряды и разнаго рода приспособленія для заимствованія изъ рѣкъ, озеръ и прудовъ воды изъ орошаемыхъ угодій. Составилъ агрономъ Н. Д. Дмитріевъ. Цѣна 75 коп., въ хороѣ переплетѣ 1 руб. 25 коп.

ОСУШКА БОЛОТЪ, мокрыхъ сѣнокосовъ и пахотныхъ полей, страдающихъ отъ избытка влаги; способы осушки открытыми канавами и подземными трубами (дренажъ), наставленіе къ изготовленію дренажныхъ трубъ. Специальное руководство по части осушки торфяниковъ и способовъ пользованія торфомъ, какъ дешевымъ матеріаломъ для отопленія жилыхъ помѣщеній, фабрикъ и заводовъ. Составилъ агрономъ Н. Д. Дмитріевъ. Цѣна 75 коп., въ хороѣ переплетѣ 1 руб. 25 коп.